Рис. 2. Чернозобик *Calidris alpina* – частичный альбинос на осушках Ольской лагуны. 2 сентября 2012. Фото автора.

В дополнение к существующим сведениям сделаем одно дополнение: одиночный чернозобик – частичный альбинос (рис. 1 и 2) был встречен 2 сентября 2012 в огромной стае чернозобиков, насчитывавшей не менее 2000 особей, на осушках Ольской лагуны (59°34′ с.ш., 151°22′ в.д.). Птица активно добывала корм на колонии мелких полихет *Dogielinotus moskvitini* (Derzhavin, 1930). Упомянутая стая куликов наблюдалась нами вплоть до 10 сентября, однако «светлого» чернозобика мы больше не видели.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск **801**: 2431-2432*

Дополнение к фауне куликов Крыма

Ю.В.Костин

Второе издание. Первая публикация в 1982[*]

В материалах Первого совещания по куликам опубликован список куликов Крыма (38 видов) с краткими сведениями о характере пребывания, численности и сроках миграции (Костин 1973). С тех пор этот список пополнился ещё 4 видами.

[*] Костин Ю.В. 1982. Дополнение к фауне куликов Крыма // *Орнитология* **17**: 167.

Xenus cinereus. Мородунка оставалась неизвестной для Крыма до 1972 года. Впервые одиночная особь была встречена в Раздольненском районе 20 июля 1972. В последующие два дня там же держалась пара. 2 и 5 августа 1973 в Советском районе на берегу Сиваша у пресноводных сливов наблюдались одиночные мородунки. 9 августа 1973 в Раздольненском районе добыта одна мородунка, а 13 августа на Средней косе в Керченском проливе отмечена группа из 3 птиц. Одиночные мородунки встречались в Раздольненском районе в период с 9 по 21 августа 1977 и 24-26 июля 1978.

Tryngites subruficollis. 28 сентября 1973 молодая самка желтозобика была добыта в окрестностях села Портовое Раздольненского района. Птица держалась в прибрежной полынно-солонцоватой степи вместе с группой кормящихся турухтанов *Philomachus pugnax*.

Numenius phaeopus. С 1974 года средний кроншнеп регулярно встречается в северной части Крыма как весной, так и осенью. Весенние встречи происходят между 22 апреля (1976 год, кулик добыт) и 24 мая. Послегнездовое появление – 28 июля. Относительно регулярно средний кроншнеп встречается в Крыму в августе и сентябре. Наиболее поздние встречи – 29 октября – 1 ноября. Все наблюдения относятся к району Лебяжьих островов. Здесь средний кроншнеп малочислен, встречаясь одиночками, парами и группами до 8 особей.

Limosa lapponica. До 1972 года для Крыма малый веретенник не был известен. Первый одиночный веретенник встречен на берегу моря в Раздольненском районе 19 сентября 1972. 20-30 сентября 1973 он оказался обычным в районе Лебяжьих островов (20 сентября на побережье длиной в 1.5 км учтено 12 птиц, 26 сентября добыты 2 птицы). Малые веретенники держались одиночно и группами до 4 птиц, отыскивая корм на мелководьях вблизи стаи больших веретенников *Limosa limosa*, но всё же обособленно. По наблюдениям В.А.Зубакина, в этом же районе 4 малых веретенника держались 21 мая 1974. В 1975-1978 годах этот вид не встречен.