

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных
Уральское орнитологическое общество

**МАТЕРИАЛЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ
П Т И Ц
НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

Сборник статей

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2005

УДК 598.2:591
М 341

Ответственный редактор:
доктор биологических наук
В. К. Рябицев

М 341 **Материалы** к распространению птиц на Урале, в
Приуралье и Западной Сибири: Сб. статей и кратких
сообщ. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. — с.

ISBN....

Десятый выпуск сообщений с новыми данными о местах гнездования, зимовки, путях миграций и залетах птиц, статьями с полным обзором орнитофауны отдельных территорий.

Сборник предназначен для орнитологов, биогеографов, преподавателей биологических факультетов, любителей птиц.

ISBN....

© Коллектив авторов, 2005
© Оформление. В. К. Рябицев,
Издательство УрГУ, 2005
© Издательство Уральского
университета, 2005

тушка, обыкновенный сверчок, обыкновенная чечевица, горная чечетка, желчная овсянка. Встречались и другие, не представляющие особого интереса, виды птиц.

Автор благодарит О. А. Светлицкого и В. П. Шубенкина за финансовую поддержку экспедиции.

ЛИТЕРАТУРА

Зубакин В. А. Реликтовая чайка // Птицы СССР. Чайковые. М., 1988. С. 69–76.

ГУМЕННИК В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

А. Я. Бондарев

Алтайский гос. аграрный университет. E. mail: altczl@ab.ru

Для сообщения использованы многолетние наблюдения автора и сведения от добровольных помощников из 20 районов Алтайского края и государственного заказника «Южный» в Новосибирской области.

Гуменник *Anser fabalis* на юге Западной Сибири не гнездится, это пролетный вид, являющийся объектом охоты. На юго-западе Алтайского края в Волчихинском и Угловском р-нах, а также в заказнике Южном гуменники не встречаются. Они останавливаются во время сезонных миграций на восточных побережьях оз. Кулундинского. Наблюдают и добывают их в Алейском, Баевском, Бурлинском, Благовещенском, Завьяловском, Мамонтовском, Новичихинском, Панкрушихинском, Поспелихинском, Третьяковском, Усть-Калманском, Шелаболихинском, Шипуновском, Хабарском р-нах. Редко встречаются гуменники в Бийском р-не — на островах Бии и Катунь, а также в Усть-Пристанском р-не, там табунки гусей до 14 птиц наблюдали на озерах Степном и Песчаном.

Таким образом, основная трасса пролета гуменников охватывает левобережья Оби на запад до оз. Кулундинского, на юго-запад — до Гилевского водохранилища. В последние десятилетия произошли изменения и расширение мест пролета и остановок этих птиц. Так, в Усть-Пристанском р-не осенью и весной гуменники прежде часто наблюдались на правобережьях Оби, в последние 7 лет там пролетают лишь лебеди. Гуменники стали обычными и многочисленными на пролете по озерам вдоль Барнаульской ленты бора, а также на Гилевском водохранилище (сооружено в 1980 г.). На нем численность гусей, останавливающихся в первых числах октября одновременно, увеличилась за последние 6 лет в 3 раза, до 1000 птиц, при этом ежедневно происходит частичная (до 500 птиц) смена состава: часть птиц утрами

отлетает вверх по Алею и не возвращается, а другие гуси утром и вечером приходят с севера на большой высоте табунами до 300 птиц. В середине октября гуменников на Гилевке остается мало. Вторая, меньшая по числу птиц, волна пролета наблюдается в конце октября — начале ноября, при снегопадах.

На севере края в Панкрушихинском и Хабаровском р-нах в 2001 г. осенью наблюдали многочисленный пролет гуменников. В этих районах гуменники начали регулярно появляться в последние три года. Характерно направление осенних путей пролета. Неоднократные наблюдения показали, что оно строго меридиональное, на юг, что не совпадает с направлениями к известным местам зимовок гуменника.

Чарышский пролетный путь и место длительных весенних кормежек, отдыха гуменников известен с 40-х гг. XX в. Сохранился он и в настоящий период. Весной здесь скапливается ориентировочно до 6 тыс. птиц, а осенью — в 2–3 раза меньше. Много гуменников останавливается в Мамонтовском заказнике и на окрестных озерах.

Сроки весеннего пролета заметно различаются на юге и севере края. В среднем течении Чарыша гуменник появляется в последних числах марта и задерживается до 20-х чисел апреля, а молодежь — до второй декады мая в местах, где его не преследуют охотники. В северных и северо-восточных районах по р. Оби эти птицы появляются во второй половине апреля и улетают в первой декаде мая. Весной наибольшие скопления гуменников наблюдаются в среднем течении Чарыша, по озерам вдоль Барнаульской ленты бора и в пойме Оби в Каменском и Шелаболихинском р-нах.

Сроки осеннего пролета повсеместно одинаковые и не зависят от погодных условий — с 20-х чисел сентября до 10-х чисел октября. Позднее этого — до 10-х чисел ноября — гуменники задерживаются на Гилевском водохранилище. В остальных районах продолжительность осенних остановок на отдых и кормежки, как правило, составляют 2–3 дня. Поэтому осенние потери популяции гуменника от алтайских охотников незначительные и не превышают в среднем на «гусиный» район несколько десятков птиц. Лишь в старых государственных заказниках, имеющих обширные водоемы-убежища от охотников, гуменники держатся до 10–15 и более дней. В окрестностях таких заказников охотникам удается отстреливать за осень до 100–200 гуменников на район. Полагаем, что осенью в крае добывается до 500–800 гуменников.

Осенние остановки этих птиц во многих местах наблюдатели увязывают с ненастной погодой, тогда гуменники летят низко и вынуждены останавливаться на отдых. При хорошей погоде с 20 сентября по 10 октября гуменники пролетают над территорией края без остановок,

незаметно. Как правило, во время осенних остановок гуменников меньше, чем весной, в несколько раз. Вероятно, весной они используют обширные пашни для усиленной кормежки после трудного перелета над пустынями и горами, где мало для этого мест. Среди добываемых в окрестностях Гилевского заказника в конце осеннего пролета гуменников много молодых, тощих птиц.

Гнездование гуменника возможно в пойме Оби выше Барнаула и в районе Ини. В августе 2004 г. в пойме Оби у Калистратихи добыты три сеголетка этого вида. Есть непроверенные сообщения о гнездовании нескольких пар гуменников на оз. Котляровском в Пospelихинском р-не и на Гилевском водохранилище.

По имеющимся на настоящее время данным можно в качестве заключения сказать следующее. Численность гуменника, пролетающего над территорией края, вероятно, не уменьшилась в последние десятилетия, что противоречит общей тенденции сокращения популяций этой птицы. Направление пролета осенью на юг позволяет предполагать что эта группировка зимует на индопакистанских зимовках. Наиболее уязвимы для охотников гуменники весной во время длительных остановок на отдых и кормежку. Весенняя охота, вероятно, побуждает их преждевременно улетать дальше на север в малокормные места, что может сказываться на успехе размножения. Осенний пролет зачастую проходит без остановок на водоемах края.

Ряд заказников с обширными озерами, а также недавно созданное Гилевское водохранилище и заказник на нем привлекают на отдых гуменников, где они обычно задерживаются и становятся добычей охотников на полях, прилегающих к охраняемым территориям. Желательно расширить Кулундинский, Мамонтовский и Гилевский государственные заказники за счет части полей, где обычно кормятся гуменники, а также серые гуси кряквы и, вероятно, пискульки и белолобые гуси.

В октябре 2004 г. в стае гуменников держались два **белых гуся** *Chen caerulescens*.

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЮЖНОГО ПОДВИДА СРЕДНЕГО КРОНШНЕПА В БАШКОРТОСТАНЕ

В. А. Валуев

Научно-учебный музей Башкирского государственного университета,
ул. Фрунзе, 32, г. Уфа, 450074. E-mail: ValuyevVA@bsu.bashedu.ru

С. Т. Аксаков (1908) сообщал о многочисленности **среднего кроншнепа** *Numenius phaeopus* на гнездовании на территории рассматри-