

УДК 616.-036.12-0.43.1-085:612.311.2

СУПОТНИЦКИЙ М.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ ВАКЦИНЫ

Резюме. Исследования по созданию вакцин, имеющих контрацептивный эффект, ведутся с конца 1920-х гг. С 1972 г. контрацептивные вакцины являются одной из приоритетных программ Всемирной организации здравоохранения (WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction). В осуществлении программы принимает участие Рокфеллеровский фонд (Rockefeller Foundation). Открыто декларируемая цель создания таких вакцин — регуляция численности населения в странах третьего мира. К настоящему времени сложились три основных направления конструирования контрацептивных вакцин: 1) вакцины, ориентированные на блокирование производства гамет; 2) нарушающие их функцию; 3) нарушающие процесс оплодотворения. Контрацептивные вакцины уже более 10 лет широко используются для снижения фертильности и кастрации диких и домашних животных. В коммерческой реализации находятся ветеринарные вакцины Equity®, Improvac®, GonaCon®, Repro-BLOC (на основе гонадотропин-рилизинг-гормона); SprayVac™ и IVT-PZP® (на основе антигенов zona pellucida). Клинические исследования показали эффективное контрацептивное действие (у женщин) вакцин, в которых в качестве антигена используется человеческий хорионический гонадотропин. В то же время обнаружены и побочные действия таких вакцин: для вакцин, содержащих в качестве антигенных компонентов гонадотропин-рилизинг-гормон и лютеинизирующий гормон, — кастрация, развитие импотенции; для содержащих фолликулостимулирующий гормон — олигоспермия; антигены zona pellucida — необратимый оофорит. В работе обсуждаются подходы к обнаружению стерилизующих компонентов в вакцинах, предназначенных для массовой профилактики инфекционных болезней, не заявленных производителями, и последствий их применения. Уже осуществленное скрытое применение контрацептивных вакцин можно предположить: 1) по наличию антител к их антигенным компонентам (у не вакцинированных контрацептивными вакцинами людей таких антител не бывает, за исключением случаев, связанных с бесплодием); 2) по изменению гормонального фона вакцинированного пациента; 3) по нарушению функционирования и патогистологическим изменениям в органах репродуктивной системы.

Ключевые слова: азооспермия, антигены, сперматозоиды, антитела, блестящая зона ооцита, гонадотропин-рилизинг-гормон, иммуноконтрацепция, контрацептивная вакцина, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, человеческий хорионический гонадотропин.

За рубежом исследования по созданию контрацептивных вакцин для людей ведутся с конца 1920-х гг. В публикациях ученых, разрабатывающих такие вакцины, обычно подчеркивается, что необходимость в них вызвана ростом численности населения планеты, особенно в странах третьего мира [2, 42, 64]. Ряд западных политиков, придерживающихся неомальтузианских взглядов (neo-malthusianism) [29], высказались о необходимости сокращения численности населения путем массовых вакцинаций контрацептивными вакцинами [12]. Цель данной работы — рассмотреть существующие подходы к конструированию контрацептивных вакцин и определить основные признаки, по которым можно распознать их скрытое применение.

История создания контрацептивных вакцин

Началось все в 1899 г., когда австрийский иммунолог Карл Ландштейнер (Karl Landsteiner, 1868–1943) и

русский ученый Илья Мечников (1845–1916), работавшие в Институте Пастера (Pasteur Institute, Париж), независимо друг от друга продемонстрировали, что инъекция гетероспецифической спермы может вызывать антительный ответ у экспериментального животного [25, 32]. В 1929 г. Morris J. Baskin, клинический директор Комитета гигиены матерей Денвера (Denver Maternal Hygiene Committee, США), использовал человеческую сперму для временной стерилизации женщин [5]. В 1937 г. им получен патент на неспецифическую спермотоксичную вакцину и способ ее получения (рис. 1).

Активным сторонником иммуноконтрацепции был британский ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2010) Роберт Эдвардс (Robert Edwards, 1925–2013) [11], основной

© Супотницкий М.В., 2014

© «Актуальная инфектология», 2014

© Заславский А.Ю., 2014

разработчик технологии экстракорпорального оплодотворения [41]. С 1972 г. контрацептивные вакцины являются приоритетной программой Всемирной организации здравоохранения (WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction). В осуществлении программы принимает участие Рокфеллеровский фонд (Rockefeller Foundation) [12, 52]. До начала 1970-х гг. сперма являлась основным объектом исследований по поиску антигенных детерминант контрацептивных вакцин, предназначенных для людей и животных. За последние 40 лет сложились три основных направления конструирования контрацептивных вакцин: 1) блокирующих образование гамет; 2) нарушающих их функцию; 3) нарушающих формирование зародыша и его имплантацию в матку (нарушающие процесс оплодотворения)




Рисунок 1. Титул патента Morris J. Baskin на неспецифическую спермотоксичную вакцину и способ ее получения [6]




Рисунок 2. Основные направления конструирования контрацептивных вакцин. На схеме показаны процесс оплодотворения и образования зародыша у человека, основные мишени контрацепции и типы контрацептивных вакцин [41]

(рис. 2). В табл. 1 показан достигнутый уровень конструирования и возможные ограничения для массового применения контрацептивных вакцин.

Основные отличия контрацептивных вакцин от вакцин, используемых для специфической профилактики инфекционных болезней

В 1978 г. V.C. Stevens [64] сформулировал два основных отличия контрацептивных вакцин от традиционных. Во-первых, антигены контрацептивных вакцин могут быть выбраны только из биологически активных молекул, в норме не вызывающих иммунного ответа. То есть основной задачей разработчиков таких вакцин является либо нарушение иммунологической толерантности к таким молекулам, либо придание им «перекрестной активности» к молекулам, участвующим в репродуктивной функции человека. Во-вторых, контрацептивные вакцины должны блокировать развитие беременности на прогнозируемый период времени.

Гормональная регуляция фертильности человека

В основе регуляции фертильности человека находится действие гонадотропин-рилизинг-гормона (гонадорелин, гонадолиберин, гонадотропин-рилизинг-фактор, gonadotropin-releasing hormone, GnRH; luteinizing-hormone-releasing hormone, LHRH) и индуцируемых им гонадотропных гормонов передней доли гипофиза: фолликулостимулирующего гормона (фоллитропин, follicle stimulating hormone, FSH) и лютеинизирующего гормона (лютеотропин, лютропин, lutropin, lutrophin, luteinizing hormone, LH).

GnRH образуется секреторными клетками гипоталамуса (отдел промежуточного мозга). Гипоталамус формирует с гипофизом единый функциональный комплекс. GnRH непосредственно взаимодействует со специфическими рецепторами клеток-гонадотропов, расположенных в передней доле гипофиза, и вызывает усиление секреции FSH и LH. В большей степени GnRH влияет на секрецию лютеинизирующего, чем фолликулостимулирующего гормона. Благодаря действию FSH и LH на гонады GnRH играет важную роль в регуляции репродуктивной функции у человека и животных. Он индуцирует синтез половых стероидных гормонов, сперматогенез и созревание фолликулов, влияет на сексуальное поведение [50].

FSH стимулирует у женщин развитие интерстициальной ткани яичников и овуляцию, что приводит к усиленной секреции женских половых гормонов — эстрогенов. У мужчин FSH вызывает развитие семенных канальцев, стимулирует сперматогенез и секрецию мужских половых гормонов — андрогенов.

Действие FSH и LH взаимосвязано и синергично. Под влиянием FSH созревающие фолликулы продуцируют эстрогены, среди которых наибольшее значение имеет эстрадиол. Одновременно FSH индуцирует в фолликулах экспрессию рецепторов к LH. В результате

Таблица 1. Достигнутый уровень конструирования контрацептивных вакцин и их возможные ограничения для массового применения [41]

Антиген	Пол вакцинируемого	Основные ограничения	Коммерчески доступные вакцины	Животные, у которых удалось осуществить контрацепцию	Использование у людей	
					Контрацепция	Возможное неконтрацептивное использование
Гонадотропин-рилизинг-гормон (gonadotropin-releasing hormone, GnRH)	Мужской и женский	Развитие импотенции	Equity®, Improvac®, GonaCon®, Repro-BLOC®	Самцы и самки вида кошачьих	Не исследовалась	Уменьшение продукции мужских половых гормонов при гипертрофии и раке простаты и чрезмерной гормональной редукции у женщин при фиброме матки, эндометриозе, поликистозе яичников, преждевременном наступлении половой зрелости
Фолликулоstimулирующий гормон (follicle-stimulating hormone, FSH)	То же	Развитие олигоспермии	Нет	Человекообразные приматы	Случаи олигоспермии	Неизвестно
Лютеинизирующий гормон (luteinizing hormone, LH)	То же	Развитие импотенции	Нет	Лабораторные животные и человекообразные приматы	Исследования не проводились	Неизвестно
Человеческий хорионический гонадотропин (human chorionic gonadotropin, hCG)	Женский	Трудно достичь высокого титра антител	Нет	Человекообразные приматы	Положительный результат	hCG-секретирующие опухоли
Антигены zona pellucida (ZP)	То же	Вызывает необратимый оофорит	SpayVac™ и IVT-PZP®	Шесть видов диких животных, собаки, человекообразные приматы	Исследования не проводились	Может быть найдено применение при лечении рака яичников
Антигены спермы	Мужской и женский	Ограничения неизвестны	Информация отсутствует	Различные лабораторные животные и человекообразные приматы	Ожидаются положительные результаты	Может быть найдено применение при лечении рака яичек

к моменту созревания фолликула уровень эстрадиола становится настолько высоким, что это приводит к активации гипоталамуса (т.е. GnRH) по принципу положительной обратной связи и интенсивному высвобождению LH и FSH гипофизом. Повышение уровня LH запускает овуляцию, при этом из яичника не только высвобождается яйцеклетка, но и инициируется процесс лютеинизации — превращения остаточного фолликула в желтое тело¹, которое, в свою очередь, начинает вырабатывать прогестерон для подготовки эндометрия к возможной имплантации. LH необходим для поддержания существования желтого тела примерно в течение 14 сут. В случае наступления беременности лютеиновая функция будет поддерживаться

действием гормона трофобласта — хорионического гонадотропина (HCG). LH стимулирует клетки в яичниках, продуцирующие андрогены и предшественники эстрадиола [28].

HCG начинает образовываться плацентой плода с первых часов беременности. Его продукция возрастает в несколько тысяч раз к 7–11-й неделе, затем постепенно снижается. Благодаря секреции значительных количеств HCG желтое тело, в норме существующее около 2 недель в течение каждого менструального цикла, у беременных не подвергается рассасыванию и остается функционально активным в течение всего срока беременности. Причем желтое тело у беременных под влиянием HCG производит большие коли-

¹ Желтое тело (corpus luteum) — временная железа внутренней секреции в женском организме, образующаяся после овуляции и вырабатывающая гормон прогестерон. Свое название получила благодаря желтому цвету содержимого.




Рисунок 3. Гормональная регуляция фертильности человека [70]

чества прогестерона, физиологически невозможные в норме в небеременном организме. Схема гормональной регуляции фертильности человека приведена на рис. 3.

HCG обладает биологическими свойствами как LH, так и FSH и связывается с обоими типами рецепторов к гонадотропинам. Лютеинизирующая активность у HCG значительно преобладает над фолликулостимулирующей. По лютеинизирующей активности он значительно превосходит «обычный» LH, производимый передней долей гипофиза.

Овечьи и человеческие гонадотропины (LH, FSH) структурно сходны между собой. Антитела к этим гормонам обладают перекрестной нейтрализующей активностью [34, 36].

Вакцины, блокирующие образование гамет

К ним относятся вакцины, блокирующие действие GnRH, FSH и LH.

Вакцины на основе гонадотропин-рилизинг-гормона. GnRH представляет собой декапептид с молекулярной массой (ММ) 1182 Да, общий для большинства млекопитающих. Установлена важная роль первых трех аминокислотных остатков в молекуле GnRH для проявления им биологической активности и боковых цепей аминокислотных остатков в положениях 2, 3 и 6 для связывания с рецепторами клеток-гонадотропов. Мо-

дификация аминокислот в этих положениях позволила получить высокоактивные и длительно действующие аналоги GnRH.

Из-за небольшой ММ и простоты строения молекулы антигенные свойства GnRH минимальны. В некоторых работах его рассматривают как гаптен [55]. Наименьшая ММ веществ, к которым удалось получить антитела без их присоединения к другим, более крупным молекулам, составляет примерно 1000 Да (вазопрессин, ангиотензин). Поэтому конструирование вакцин фертильности на основе GnRH с самого начала пошло по пути повышения его антигенных свойств. В конце 1980-х гг. для решения этой технической задачи использовалось конъюгирование GnRH с иммуностимулирующими носителями, в качестве которых обычно использовали дифтерийный и столбнячный токсиды, В-субъединицу экзотоксина А псевдомонад (например, с носителем, имеющим ММ до 1 мДа, ковалентно сшивали от двух до семи молекул GnRH [59, 71]), масляные, поликатионные адъюванты [3], FSH и LH [53] и др. В 1990-х гг. разработчики вакцин фертильности стали увеличивать плотность антигенных эпитопов путем получения методами генной [19] или белковой инженерии мультимерных (до 12 молекул GnRH) или тандемных форм GnRH. Затем их конъюгировали с высокоиммуногенными носителями [51] либо смешивали с эффективными адъювантами, например с полным адъювантом Фрейнда² [31].

Открытие в 1997 г. второй формы GnRH, названной GnRH-II (соответственно, первая его форма в тех случаях, когда сравнивается их действие, обозначается как GnRH-I), показало, что управление фертильностью со стороны гипоталамуса является значительно более сложным процессом, чем считалось ранее. GnRH-I и GnRH-II синтезируются разными нейронными системами и отличаются друг от друга по антигенным свойствам (рис. 4).

Предполагается, что основная роль GnRH-I-нейронов в гаметообразовании заключается в периодической стимуляции синтеза LH (созревание гамет и синтез половых стероидных гормонов), в то время как основная роль GnRH-II-нейронов — преовуляторные выбросы LH [76]. Открытие двух форм GnRH привело к созданию вакцин, представляющих их композиции (GnRH-I/GnRH-II). Такие вакцины разрабатываются для лечения рака простаты у людей и кастрации животных [17].

Однако вакцины, включающие иммуностимулирующие носители и адъюванты, имеют ряд серьезных недостатков, проявляющихся при массовом применении. Адъюванты вызывают образование абсцессов и гранулем, иммуностимулирующие носители — эффект доминирования, когда основной иммунный ответ приходится на них. Кроме того, сам процесс образования конъюгатов GnRH и носителей с использованием карбодимидной реакции трудно предсказуем по получаемым конечным продуктам. Поэтому в прошлом десятилетии сформировались новые направления конструирования GnRH-вакцин:

² Адъюванты Фрейнда: неполный адъювант представляет собой водно-жировую эмульсию, содержащую вазелиновое масло, ланолин и эмульгатор. Депонирует антиген и усиливает его захват фагоцитами. Полный адъювант включает в себя, кроме вышеперечисленных компонентов, БЦЖ или мурамилдипептид. Это позволяет ему дополнительно активировать макрофаги и костимулировать Т-клетки.




Рисунок 4. Молекулярная структура GnRH-I и GnRH-II: А — сравнение аминокислотных последовательностей GnRH-I и GnRH-II. Сходство аминокислотных последовательностей 70 %; Б — слева квадратом обозначена гипоталамическая область мозга, справа — распределение GnRH-I и GnRH-II мРНК в гипоталамусе макаки-резус; SON — супраоптическое ядро; PVN — паравентрикулярное ядро; SCN — супрахиазматическое ядро; MBH — медиальная часть базального гипоталамуса; OC — зрительный перекрест; Ot — зрительный тракт [76]

— введение в антигенную композицию пептидов с эпитопами, распознаваемыми Th-хелперами, — белка F вируса кори, белка CSP возбудителей малярии и др. Такие композиции формировались путем слияния через спейсерную группу пептидов, обладающих выраженными антигенными свойствами, с GnRH [14];

— использование в качестве антигена белковых структур рецепторов, специфических для GnRH [8];

— использование в качестве антигена слитых с GnRH гликозилированных белков (устранение эффекта доминирования иммуностимулирующего носителя в иммунном ответе на GnRH) [55].

Наиболее типичной для современных GnRH-вакцин является вакцина Improvac®. В России она свободно продается для ветеринарных нужд. По техническому уровню соответствует разработкам второй половины 1980-х гг. Ветеринарные вакцины GonaCon®, Repro-BLOC® отличаются от нее составом адьювантной композиции и схемами применения.

Вакцина Improvac®. Производится Pfizer Inc. В основном используется в свиноводческих хозяйствах для кастрации хряков и получения мяса «без запаха».



Рисунок 5. Половая система хряка до и после иммунокастрации вакциной Improvac® [60]

Одна доза вакцины в качестве действующего вещества содержит 0,4 мг аналога GnRH, конъюгированного с дифтерийным анатоксином, 300 мг ДЭАЭ-декстрана в качестве адьюванта, 0,2 мг тиомерсала в качестве консерванта, мочевины и стерильную воду в качестве вспомогательных веществ. В результате вакцинации в сыворотке крови животного резко понижается уровень тестостерона, LH, FSH, снижается вес и уменьшаются размеры семенников, простаты. Клетки Лейдига³ пикнотизируются, их количество сокращается. Нарушается сперматогенез (атипичная форма сперматозоидов, утраты головки, дефекты акросомы⁴ и др.). Аналогичные данные получены М. Hilbe et al. [18]. На рис. 5 показаны последствия иммунокастрации на примере половой системы хряка.

Вакцины на основе лютеинизирующего гормона. LH по строению похож на другие гормоны-гликопротеины: тиреотропный гормон, HCG, FSH. Его ММ 28,5 кДа. Гликопротеин представляет собой димерную структуру, состоящую из двух субъединиц — альфа и бета, соединенных двумя дисульфидными мостиками, к каждой из которых присоединены углеводные остатки. Альфа-субъединицы LH, тиреотропного гормона, HCG, FSH идентичны и состоят из 92 аминокислотных остатков. Бета-субъединицы гормонов различаются. Бета-субъединица LH (121 аминокислота) определяет его биологическое действие, специфически взаимодействуя с мембранным рецептором. Она содержит ту же последовательность аминокислот, что и HCG, и стимулирует тот же самый рецептор. Однако HCG имеет 24 дополнительных аминокислоты, и оба гормона существенно отличаются друг от дру-

³ Клетки Лейди́га — гормонопродуцирующие клетки млекопитающих, расположенные между семенными канальцами в семенниках, в них производится тестостерон и другие соединения андрогенного ряда, также в них образуется небольшое количество женских половых гормонов эстрогенов и прогестинов. Клетки Лейди́га стимулируются LH.

⁴ Акросо́ма (апикальное тельце, перфораторий) — органоид сперматозоида, расположенный в передней части его головки. Представляет собой мембранный пузырек, содержащий ферменты, растворяющие яйцевую оболочку яйцеклетки — zona pellucida. При оплодотворении в результате воздействия на сперматозоид сигнальных веществ оболочки яйцеклетки и содержимого яйцевода происходит акросомная реакция, в ходе которой акросома сливается с наружной мембраной яйцеклетки и растворяет ее.

га своїми углеводними компонентами. Різлична структура олигосахаридних фрагментів впливає на біологічну активність і швидкість руйнування гормонів. Період полураспада LH становить 20 мин, що коротше, ніж у FSH (3–4 ч) і HCG (24 ч) [28]. Відомо про дві напрямки конструювання вакцин на основі LH: 1) в якості антигенної детермінанти використовується його бета-суб'єдиниця; 2) в якості антигенної детермінанти використовується зовнішня частина рецептора клітки, специфічно взаємодіючого з LH.

Прототипна вакцина створена в середині 1980-х гг. на основі бета-суб'єдиниці LH і повного адьюванта Фрейнда. В експериментах на нечоловекообразних приматах було показано її контрацептивне дієвство [61]. При вакцинації бичків вакциною на основі кон'югата LH з людським сировоточним альбуміном досягнуто зниження рівня тестостерону в сировотці і редукція яєчок [21, 57].

Антитіла, отримані в результаті вакцинації овечим LH, виявилися здатними зв'язувати LH приматів (обезьян і людей) і кроликів. При цьому кількість тестостерону в сировотці крові через 8–16 нед. після вакцинації знижалося на 90 %, що призводило до азооспермії⁵. Через 15–18 нед. після вакцинації кількість сперматид⁶ (розвиваючися чоловічі статеві клітини в період сперміогенезу) в популяції зменшувалося більш ніж на 90 %; сперматозоїди⁷ (розвиваючися зі сперматогонієв⁸ чоловічі статеві клітини, предшественники сперматид) — більш ніж на 50 % [67, 68].

В якості антигену використовували амінокислотну послідовність рецептора, специфічно взаємодіючого з LH на поверхні клітки-мішені. Результати були отримані суперечливі [20, 21]. В наступні роки обидва напрямки конструювання контрацептивних вакцин на основі LH не отримали розвитку.

Вакцини на основі фолікулоstimулюючого гормону. FSH — глікопротеїн з ММ близько 30 тис. Да. Його молекула складається з двох різних за структурою суб'єдинць (альфа-FSH і бета-FSH), нековалентно зв'язаних одна з одною. Молекули FSH людини і різних видів тварин мають значущу гомологію. Бета-ланцюг специфічний для даного гормону, складається з 118 амінокислотних залишків. Видових відмінностей в структурі альфа-суб'єдиниці значущо більше, ніж в структурі бета-FSH. Углеводна частина FSH становить близько 15 % його ММ і характеризується гетерогенністю. Кожна з суб'єдинць FSH містить по дві олигосахаридні ланцюги, з'єднані з поліпептидним ланцюгом N-глікозидної зв'яззю, обра-

зуємий залишками N-ацетилглюкозаміну і амідної групою залишків аспарагіну. Олигосахаридні ланцюги необхідні для з'єднання суб'єдинць і підтримки належної конформації молекули. Також вони захищають поліпептидні ланцюги суб'єдинць від розщеплення протеолітичними ферментами. Специфічні біологічні властивості FSH обумовлені бета-суб'єдиницею, набуваючою біологічну активність після з'єднання з альфа-суб'єдиницею.

Більша частина робіт з вивчення контрацептивної здатності вакцин на основі FSH виконана з використанням гормону овечого походження. Антитіла до овечого FSH перехрестно реагують з FSH інших видів, в тому числі і приматів (обезьян, людина), але не дають перехрестних реакцій з людським тиреотропним гормоном і LH, маючи велике подібність до альфа-суб'єдинць.

Толчком до розробки вакцин на основі FSH стали дослідження, виконані в 1978–1979 гг. У обезьян, вакцинованих овечим FSH, виявили дисфункцію, хоча ніяких змін в концентрації тестостерону в сировотці крові не відбувалося [39, 58]. Конструювання вакцин велося по двом напрямкам: 1) підвищення імуногенності FSH або його бета-суб'єдиниці (фрагмента бета-суб'єдиниці, що містить епітоп, викликає утворення антитіл до рецептору гормону), для чого гормон (бета-суб'єдиницю або її фрагмент) сорбовували на гідроокисі алюмінію або зшивали з дифтерійним анатоксином або натрій-фталат-похідним ліпополісахариду (sodium phthalate derivative of lipopolysaccharide, SPLPS); 2) отримання вакцин на основі амінокислотної послідовності рецептора (амінокислоти 1–134), специфічно взаємодіючого з FSH на поверхні клітки-мішені.

Порівняльне дослідження антигенних властивостей нативного FSH і його бета-суб'єдиниці показало, що антитіла до FSH мають на порядок більш сильну афінність до нього, ніж антитіла до бета-суб'єдиниці. Однак N.R. Moudgall, M. Jeyakumar et al. [37] рекомендували розробникам контрацептивних вакцин використовувати бета-суб'єдиницю з ефективним адьювантом, а не повний FSH, так як в цьому випадку на імунну систему вакцинованого створюється менша антигенна навантаження, обумовлена наявністю неспецифічних епітопів у альфа-суб'єдиниці гормону. Специфічні антитіла, утворені в результаті вакцинації, зв'язують FSH в сировотці крові до величин, не визначуваних стандартними імунологічними методами.

Контрацепція, розвиваючися в результаті вакцинації FSH і білком його рецептора, є наслідком

⁵ Азооспермія — патологічний стан, при якому в еякуляті відсутні сперматозоїди.

⁶ Сперматид — чоловіча статеві клітина на 4-й стадії розвитку. Має гаплоїдний набір хромосом. Виникає в результаті ділення сперматозоїтів другого порядку. В результаті циклу структурних змін перетворюється в сперматозоїд.

⁷ Сперматозоїд — чоловічий гаметоцит. В процесі сперматогенезу виникає зі сперматогонієв шляхом мейотичного ділення. Процес відбувається в статевих канальцях тестисів.

⁸ Сперматогонії — диплоїдні початкові чоловічі статеві клітини.

виєм ухудшення якості сперми вакцинованого. Вакцинація белком рецептора FSH, виконана в опитах на самцях обезьян, показала, що безпліддя може бути досягнуто без наступлення азооспермії. Блокування рецептора FSH суттєво впливає на проліферацію сперматогоній і продукцію сперматозоїтів, але мейоз, етап, на якому відбувається формування сперматид, він не затримує. Завдяки значальному зменшенню кількості сперматогоній, доступних для мейотичного поділу, у вакцинованого значально зменшується кількість сперматозоїтів. В результаті у нього розвивається олигозооспермія⁹, але не азооспермія. Втрата тестікулярного впливу гіпоталамуса, здійснюваного за допомогою FSH, призводить до появи в еякуляті незрілих сперматозоїдів. Аналогічним чином змінюється якість сперми після вакцинації FSH (табл. 2).

В експериментах по вакцинації добровольців овечим FSH було встановлено, що в сировотці крові не змінюється концентрація таких гормонів, як LH, тиреотропний гормон, тестостерон, тироксин, трийодтиронін. FSH (в нормі його вміст у чоловіків 1–5 нг/мл) може не визначатися стандартними імунологічними методами на піку

Таблиця 2. Якісні показники сперматозоїдів обезьян, вакцинованих FSH [37]

Показатель	Ефект
Кількість в еякуляті	В 80 % еякулята скорочено на 70 %
Життєспроможність	Знижена на 50 %
Подвижність (gross motility)	Знижена на 40–50 %
Проникновеність через гель	Знижена на 90 % при 15 мм
Активність по акрозину промитих сперматозоїдів	Знижена на 74 %
Гіалуронідазна активність промитих сперматозоїдів	Знижена на 34 %
Активність циклічного АМФ промитих сперматозоїдів	Знижена на 42 %
Активність АТФ промитих сперматозоїдів	Повишена до 500 %
З'єднання з гомологічними ооцитами обезьян	Заметно інгібовано
Проникновеність в zona-denuded яйцеклітини хом'яка	Блоковано
Деконденсація хроматину сперматозоїдів	Висока чутливість до дитіотрейтолу, індукційована деконденсацією хроматину
Вміст акросому у сперматозоїдах	Значально зменшено

концентрації специфічних антитіл. Зміни сперми такі ж, як у вакцинованих FSH обезьян (табл. 2) [37].

Ні перше, ні друге наведення конструювання вакцин контрацепції на основі FSH не дозволило досягти тривалого чоловічого безпліддя. Вакцинація макаків-резусів овечим FSH привела у них до важких порушень сперматогенезу в період 1–2 років, однак в період 4,5 років, незважаючи на періодичне повторення вакцинації і олигозооспермію, відбулося якісне (але не кількісне) відновлення сперматогенезу і фертильності [48, 62]. Причиною, чому повторні прививки овечого FSH не пригнітили незворотного сперматогенезу, залишилася нез'ясованою [34, 35, 37].

При вакцинації рецепторним белком контрацепція виявилася непродовжительною, не більше 300 днів, і могла бути досягнута тільки після двох-трьох ін'єкцій антигену з ад'ювантом. При цьому значально знизилася кількість сперматозоїдів і їх подвижність. Зміни кількості тестостерону в сировотці крові не спостерігалося [35, 38]. Обидва наведення не отримали серйозного розвитку за останні роки.

В більш пізній роботі R.K. Naz [41] висловлено сумнів у перспективності для медичної контрацепції всього наведення створення контрацептивних вакцин, блокують формування гамет, в зв'язі з їх вираженим впливом на продукцію стероїдних гормонів. По його думці, такі вакцини широко будуть використовуватися тільки в ветеринарній практиці для кастрації тварин і в терапевтичних цілях в клінічних ситуаціях, що вимагають інгібування секреції статевих стероїдів (міома матки, синдром полікістозних яєчників, ендометріоз і тимчасове статеве дозрівання — вакцини на основі GnRH і LH).

Вакцини, порушують функції гамет

До них відносять вакцини, що порушують приєднання сперматозоїда до *zona pellucida* ооцита і блокують подвижність і життєспроможність сперматозоїдів.

Вакцини на основі антигенів *zona pellucida*. ЗР (раніше називалася *zona striata*, в російській мові відповідає терміну «блискуча оболонка», використовується рідко) — прозора еластична глікопротеїнова оболонка навколо плазматичної мембрани яйцеклітини млекопитаючих тварин і людини. Її товщина у людини становить 5–10 мкм. Через неї вільно проникає вода і розчинені в ній речовини, антитіла, ферменти і невеликі віруси. В індивідуальному розвитку яйцеклітини ЗР утворюється на стадії росту, коли вона розвивається в складі первинного фолликула. Глікопротеїни ЗР синтезує яйцеклітка [79] (рис. 6).

⁹ Олигозооспермія — зменшення кількості сперматозоїдів в еякуляті менше ніж 20 млн/мл.




Рисунок 6. Яйцеклетка в процесі оплодотворення: А — сперматозоїди, зв'язані з ЗР яйцеклетки. Масштабна лінійка відповідає 13 мкм; Б — мікрофотографія ЗР яйцеклетки, зроблена скануючим електронним мікроскопом. Масштабна лінійка відповідає 200 нм [77]; В — схема, що показує етапи оплодотворення: 1 — оплодотворення яйцеклетки починається після зв'язування інтактною акросомою сперматозоїда з zona pellucida (ЗР); 2 — зв'язування сперматозоїда з родственным рецептором на ЗР3 індуктує сигнальний трансдукційний каскад (signal transduction cascade), приводящий до акросомальної реакції; 3 — проникнення сперматозоїда через матрикс zona pellucida; 4 — яйцеклетка і плазматична мембрана сперматозоїда сливаються, починається розвиток зиготи. Кортикальна реакція, розвиваючись після оплодотворення яйцеклетки, приводить до втрати zona pellucida зв'язуючої активності в отношении сперматозоїдів і передотвращає поліспермію [16]

ЗР переважно формують три глікопротеїни (ZP1, ZP2 і ZP3), що показують різну подвижність в поліакриламідному гелі-електрофорезі, проводимому в присутності додецилсульфату натрію (sodium dodecyl sulphate — polyacrylamide gel electrophoresis, SDS — PAGE). В складі ЗР людини виявлені чотири глікопротеїни: ZP1, ZP2, ZP3 і ZP4. Класифікація глікопротеїнових антигенів ЗР формувалася применительно до різних об'єктів дослідження, в різне час, і тому в літературі зустрічаються різні найменування одних і тих же антигенів. Найбільш розповсюджена «мишиня» класифікація, яку ми використовуємо в даній роботі. В табл. 3 приводяться приклади класифікацій глікопротеїнових антигенів ЗР.

Глікопротеїни ЗР, виділені з яйцекліток різних видів млекопитаючих, при схожості структури самих поліпептидів мають різну подвижність в SDS — PAGE, що є наслідком їх різної посттрансляційної модифікації, включаючи глікозилювання. Глікопротеїни ЗР яйцеклітки людини (human zona pellucida, hZP) мають наступну ММ: hZP1 (~100 кДа), hZP2 (~75 кДа), hZP3 (~55 кДа), hZP4 (~65 кДа) [77].

ЗР грає основну роль в розпізнаванні і зв'язуванні сперматозоїда з ооцитом, індукції акро-

сомального ендоцитоза в zona-bound сперматозоїда і перешкоджає проникненню більш одного сперматозоїда в яйцеклітку, т.е. блокує поліспермію. ЗР2 і ЗР3 є лігандами для рецепторів на головці сперматозоїдів, відповідальних за зв'язування з zona pellucida і запуск акросомної реакції. ЗР3 індуктує поглинання сперматозоїда яйцеклеткою [77].

Після проникнення сперматозоїда в яйцеклітку запускається каскад біохімічних реакцій, що призводить до опорожненню кортикальних везикул — мембранних бульбашок, що містять літичні ферменти. Вміст кортикальних везикул викидається назовні (в перивітелінове простір) і модифікує zona pellucida таким чином, що наступні сперматозоїди вже не можуть проникнути через неї. Проникнення одного сперматозоїда в яйцеклітку — необхідне умовою для розвитку ембріона¹⁰ [79]. Амінокислотні послідовності білків ЗР людини і тварин мають велику схожість між собою (табл. 4).

Представлені в табл. 4 дані пояснюють гетероспецифічність антитіл, що утворюються до глікопротеїнів ЗР різних видів тварин і людини. Глікопротеїни ЗР свині (porcine zona pellucida, PZP) зазвичай використовуються як антигени вибору для дослідження контрацептивного впливу таких вакцин у

Таблиця 3. Класифікації глікопротеїнових антигенів ЗР [30]

Різні млекопитаючі*	Миші	Кролики	Свині	Люди
ZPA	ZP2	Rec75	ZP1, ZP2, ZP4	ZP2
ZPB	ZP1	Rec55	ZP3a	ZPB
ZPC	ZP3	ZPC	ZP3b	ZP3

Примечание: * — крупный рогатый скот, кошки, собаки, макаки.

¹⁰ Ембрион — стадия развития организма, начиная со стадии зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек.

Таблица 4. Сходство аминокислотных последовательностей белков ZP человека и животных [46]

Семейство ZP	Вид	Длина полипептидной цепи	Идентичность с человеком (%)
ZP1	Мышь	622	39
	Кролик	533	71
	Свинья	533	68
	Индийская макака	539	92
	Человек	565	–
ZP2	Мышь	733	60
	Кролик	672	72
	Свинья	716	64
	Индийская макака	745	94,2
	Человек	745	–
ZP3	Мышь	424	67
	Кролик	415	69
	Свинья	420	74
	Индийская макака	424	93,9
	Человек	424	–

людей и приматов [46]. Сравнительные исследования контрацептивного действия гликопротеинов ZP человека, проведенные на макаках (*Macaca fascicularis*) и бабуинах (*Papio anubas*), показали, что наиболее длительной контрацепции (от 9 до 35 мес.) удается достичь при использовании ZP1 в качестве антигенного компонента вакцины [30].

Данное направление конструирования контрацептивных вакцин активно развивалось в 1980-х гг., повторяя те закономерности развития, через которые прошли вакцины, блокирующие образование гамет. В качестве адъювантов использовался полный и неполный адъюванты Фрейнда, сквален, липосомы и др.; в качестве иммуностимулирующего носителя — дифтерийный токсин. Для получения высокоочищенных препаратов гликопротеинов гены ZP клонировали в эукариотических и прокариотических организмах и на их основе получали продуценты отдельных гликопротеинов [1, 15, 19, 46].

Одновременно накапливались сведения о поствакцинальных осложнениях, развивающихся через несколько месяцев после вакцинации гликопротеинами ZP. Схема представлений о процессе оплодотворения яйцеклетки, в соответствии с которой антитела конкурируют со сперматозоидами за специфические участки на поверхности ZP и тем самым блокируют его проникновение в яйцеклетку, не учитывала многие другие варианты событий, вызванные активизацией внутриклеточных сигнальных путей (рис. 7).

В конце 1980-х гг. было установлено, что у макак, вакцинированных ZP3 яйцеклетки свиньи (50 мкг) в полном адъюванте Фрейнда, достигался длительный контрацептивный эффект (не менее 540 сут. — срок наблюдения) на фоне высоких титров антител к ZP3, но он сопровождался развитием дегенеративных изменений в яичниках (рис. 8).

Гистологическое изучение яичников, извлеченных из животных, вакцинированных ZP3 в полном адъюванте Фрейнда, показало заметное снижение количества фолликулов. Яичники в основном содержали первичные фолликулы, расположенные вдоль периферии кортекса. Вторичные фолликулы были значительно меньших размеров, чем в норме. Они выглядели как сотовые агрегаты, связанные через базальную




Рисунок 7. Схема фармацевтической компании-производителя, иллюстрирующая контрацептивное действие вакцины SprayVac™. Действие антител к ZP объясняется покупателю вакцины с доступных для понимания механических позиций. Однако при взаимодействии антител с рецептором происходит не только его экранирование от сперматозоидов, но и активизация внутриклеточных сигнальных путей, приводящая к трудно прогнозируемым биологическим эффектам. В данном случае они проявляются дегенеративными изменениями яичников




Рисунок 8. Дегенеративні зміни яєчників індійської макаки, викликані вакцинацією ZP3 в повному ад'юванті Фрейнда: 1 — фолликули яєчників без ооцитів з участками щільного матриксподібного матеріалу. Увеличення в 800 раз; 2 — фолликулярна атрофія. Атрофированні овариальні фолликули розположені в виді компактних клітинних агрегатів, маючих вид сот. Стрілкою показан фолликул, підвергнутий резорбції. Увеличення в 1200 раз; 3, 4 — атрофированні фолликули, підвергнуті резорбції. Стрілками показана фібріозна соединительна тканина і гіаліновий матеріал навколо фолликулів. Увеличення в 1800 раз [13]

пластинку. Ети рештки фолликулярної тканини знаходились в процесі розсащування і були оточені фібріозною соединительною тканиною і гіаліновим речовиною¹¹. Лейкоцитарної інфільтрації, характерної для хронічного запального процесу, не було відмічено [13, 75].

Аналогічні результати в те роки були отримані іншими дослідниками, але у них залишалася надія на те, що фолликулярні ускладнення викликані або дією ад'юванта, або наявністю примісей інших білків, потрапивши в вакцину разом з погано очищеним первинним сировиною, отримуваним дослідниками на бойні [22, 54]. З метою отримання більш однорідних препаратів глікопротеїнів ZP використовували технологію рекомбінантної ДНК. Гени ZP клонували і переносили в спеціальні клітини-продуценти, отриманий продукт ретельно очищали від примісей інших білків і кон'югували

з дифтерійним токсидом. Але результати виявилися розчаровувальними. Конкуренції со сперматозоїдами за специфічні ділянки на поверхні ZP не відбулося. Розвиток стерильності у вакцинованих собак супроводжалося дегенеративними змінами яєчників [24, 63].

Бабуїни (*Pario anubis*), которым була введена експериментальна вакцина на основі рекомбінантних обезьяних (*Macaca radiata*) ZP1 і ZP2, кон'югованих з дифтерійним токсидом, залишилися безплідними вже після того, як із сироватки їх крові зникли антитіла до цих глікопротеїнів. Гістологічне дослідження яєчників імунізованих обезьян дозволило встановити наявність фолликулів, підвергнутих зворотному розвитку або не досягли зрілості (atretic follicles), і дегенеративні ооцити, що пояснювало безпліддя тварин в відсутності антитіл, специфічних до ZP1 і ZP2 [13].

Із ZP-вакцин найбільше застосування в ветеринарній практиці знайшли SpayVacTM і IVT-PZP (ImmunoVaccine TechnologiesTM, IVT; Галіфакс, Нова Шотландія, Канада). Вакцини призначені для зниження фертильності диких тварин, крім родини кошачьих. Зміщують комплекси глікопротеїнів ZP, отриманих із яйцекліток свиней шляхом водно-теплової екстракції. В якості ад'юванта переважно використовується повний ад'ювант Фрейнда або інші масляні ад'юванти. Основне відміння вакцини SpayVacTM від IVT-PZP в тому, що у неї антиген включений в ліпосоми (власна запатентована технологія). Віділяються способи приготування антигенів, схеми вакцинації і склад ад'ювантів при первинній і бустерній вакцинації. Блокують фертильність тварин на період від 22 міс. до 7 років (в залежності від виду тварини, використовуваного ад'юванта і схеми вакцинації) [33]. По технічному рівню відповідають розробкам другої половини 1980-х рр. В більш пізніх патентах на контрацептивні вакцини в якості антигену ImmunoVaccine TechnologiesTM захищаються глікопротеїни ZP, отримані за технологією рекомбінантної ДНК [9].

Вакцини, блокуючі рухливість і життєспроможність сперматозоїдів

Це напрямлення конструювання вакцин фертильності з'явилося в кінці 1920-х рр. і з тих пор вважається дослідниками самим перспективним [40]. Причина такого оптимізму заключається: 1) в простоті самої ідеї використання білків сперматозоїдів в якості антигенів для вакцинації як чоловіків, так і жінок; 2) результатах ранніх експериментів М.І. Баскін [5, 6], показавшого можливість досягнення тимчасового безпліддя у чоловіків і жінок, вакцинованих екстрактами сперми; 3) виявленні антигенних властивостей у сперми. Антитіла до сперматозоїдам виявляють у 70 % вазекто-

¹¹ Гіалін — прозористе скловидне білковое речовина щільної консистенції, стійке до дії кислот і щелочей, фарбуються кислотними фарбами.

мированих¹² мужчин [27] и в 2–30 % случаев семейного бесплодия, ассоциированного с присутствием антител к сперматозоидам у мужчин и/или женщин [49]. Однако ожидания быстрого успеха в создании универсальной контрацептивной вакцины оказались слишком оптимистичны. В конце 1980-х гг. был идентифицирован только 1 % белков сперматозоидов, и еще меньше было известно о том, какие из них доступны для действия антител [61].

По данным Suri Anil [2] и R.K. Naz [40, 42, 44], наиболее исследованными антигенами сперматозоидов, рассматриваемых специалистами как антигены для вакцин фертильности, являются следующие.

SPAG9 (sperm associated antigen 9) — белок с ММ 79 кДа. Видимо, находится в головке сперматозоида, так как специфическая к нему сыворотка склеивает сперматозоиды «головка к головке». Антитела к этому белку обнаружены у бесплодных женщин с нормальными эндокринными профилями и не имеющих сужения маточных труб. Антитела к SPAG9 перекрестно реагируют со спермой многих видов животных.

РН-20 (РН-20 antigen) — бифункциональный плазмомембранный белок спермы, обладающий гиалуронидазной активностью. Позволяет акросоме сперматозоида пройти через слой клеток вокруг ооцита и благодаря акросомальной реакции связаться с zona pellucida. Вакцинация морских свинок обоим полов антигеном РН-20 приводила к бесплодию животных. Впоследствии было показано, что у самцов вместе с бесплодием развивался аутоиммунный орхит, проявлявшийся отсутствием сперматозоидов в придатке яичка¹³.

SP-10 — акросомальный специфический белок, обнаруженный в сперматозоидах людей, мышей, лис, обезьян (бабуинов и макак), крупного рогатого скота и свиней. Входит в наружный акросомальный комплекс белков. В эксперименте в условиях *in vitro* антитела к белку SP-10 блокируют проникновение сперматозоидов в яйцеклетку хомяка.

Специфическая лактатдегидрогеназа яичек LDH-C4 (testis specific lactate dehydrogenase LDH-C4) — ферментативно активная тетрамерная форма фермента с ММ 140 кДа. LDH-C4 изучается уже более двух десятилетий и поэтому хорошо охарактеризована. Считается очень перспективным антигеном для вакцин фертильности данного типа. Однако в экспериментах на яванских макаках, когда использовался конъюгат LDH-C4 с участком молекулы столбнячного токсина, включающим эпитоп для Т-клеток, снизить фертильность вакцинированных животных не удалось [74].

МДС-белок (metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein) — семейство интегральных мембранных белков, включающих различные по первичной структуре металлопротеиназоподобные домены (metalloproteinase-like domain), также известные как ADAM-семейство белков (ADAM family protein). В фертильности играют роль белки семейства, синтезирующиеся в яичках: фертилин бета (fertilin β , ADAM2), циритестин (cyritestin, ADAM3; tMDC I), ADAM 5 (tMDC II), ADAM 6, ADAM 16 (xMDC 16), ADAM 18 (tMDC III), ADAM 20, ADAM 21, ADAM 24 (testase 1), ADAM 25 (testase 2), ADAM 26 (testase 3), ADAM 29 и ADAM 30. Пять из белков семейства ADAMs (фертилин бета, циритестин, ADAM 5, ADAM 16, ADAM 18) имеют отношение к процессу оплодотворения яйцеклетки и/или созреванию сперматозоидов. Их основная роль в процессе оплодотворения заключается во взаимодействии между плазматическими мембранами сперматозоида и яйцеклетки.

Фертилин бета (fertilin β) — один из первых хорошо охарактеризованных «клеточных дезинтегринов» (cellular disintegrins). Вызывает слияние сперматозоида и яйцеклетки. Фертилин бета является одной из субъединиц димеризованного антигена спермы (dimeric sperm antigen), который перекрестно реагирует с одним из антител, ингибирующих фертилизацию, известных как РН-30. Фертилин бета и циритестин имеют сходные аминокислотные последовательности.

Белок DE (protein DE; acidic epididymal glycoprotein, AEG) — гликопротеин, ММ 37 кДа. В течение эпидидимального созревания (эпидидимальный, т.е. относящийся к придатку яичка) находится в дорсальном регионе головки сперматозоида. Антитела к белку DE/AEG ингибируют его проникновение в свободную зону яйца (zona free egg).

Пептидная последовательность YLP12 (peptide sequence YLP12) — обнаружена в сперме человека и участвует в связывании сперматозоида с яйцеклеткой. Включает 12 аминокислотных последовательностей (YLPVGGLRRIGG). Для исследования контрацептивного эффекта в экспериментах на мышах использовался конъюгат декамера YLP12 с нетоксической β -субъединицей холерного токсина в качестве иммуностимулирующего носителя. Конъюгат вводили экспериментальным животным двумя способами: парентерально и интраназально, другие адъюванты не использовались. Оба способа вакцинации оказались эффективными: в сыворотке крови и слизистой влажной оболочке обнаружены антитела, специфически связывающие сперматозоиды. Фертильность животных оказалась полностью подавленной в течение не менее 305–322 сут. после появления в крови антител к дека-

¹² Вазэктомия — хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к стерильности при сохранении половых функций. У мужчины после вазэктомии сохраняется половое поведение: либидо, эрекция, эякуляция. Но непроходимость семявыносящих протоков приводит к отсутствию в эякуляте сперматозоидов.

¹³ Придаток яичка (эпидидимис) — парный орган мужской половой системы, служащий для созревания, накопления и продвижения сперматозоидов.

меру. Антитела к YLP12 обладали контрацептивным действием. Они блокировали капацитацию¹⁴, акросомальную реакцию и способность сперматозоидов мышей и человека связываться с яйцеклеткой. Пептидные последовательности эпитопов располагались на мембранном белке с ММ 50 кДа, локализованном на акросоме и хвосте сперматозоида (рис. 9).

Большинство исследований по вакцинации антигенами сперматозоидов выполнено на мышах. И ни одно из них не дало 100% блокирования фертильности. Максимальное снижение фертильности не превышало 75 %. Существует проблема сопоставимости результатов, полученных на разных экспериментальных моделях. Яичники самок мышей за время одного цикла овуляции производят приблизительно 20–50 ооцитов. У женщин, как правило, созревает одна яйцеклетка на цикл. Следовательно, нет никакой уверенности в том, что достигнутое в экспериментах на мышах снижение фертильности удастся воспроизвести у людей [42].

Для повышения эффективности вакцин, блокирующих подвижность и жизнеспособность сперматозоидов, в последнее десятилетие сформировались два новых направления: 1) повышение мультиэпитопности вакцины, т.е. в качестве антигенов в вакцине используют несколько антигенов сперматозоидов [43]. Появление данного направления свидетельствует об исчерпании возможностей дальнейшего наращивания антигенности моновакцин данного типа путем введения в их состав сильных адъювантов или конъюгирования антигена с иммуностимулирующим носителем;




Рисунок 9. Взаимодействие YLP12-антител со сперматозоидами человека: А — изображение, полученное с помощью непрямо́й иммунофлюоресценции. Увеличение в 650 раз; Б — изображение, полученное с помощью иммуносканирующей электронной микроскопии. Увеличение в 10 тыс. раз. Антитела взаимодействуют с акросомой (1) и хвостом сперматозоида (2). Для контрастирования используются частицы золота (показаны стрелками) [45]

¹⁴ Капацитация — комплекс физиологических преобразований, в результате которых сперматозоид приобретает способность проникать в яйцеклетку; предполагается, что в процессе капацитации происходит удаление с поверхности сперматозоидов факторов, блокирующих активность акросом.

¹⁵ Зигота — клетка, образующаяся в результате слияния яйцеклетки и сперматозоида.

¹⁶ Бластоциста — ранняя стадия развития зародыша млекопитающих (в том числе человека). Стадия бластоцисты следует за стадией морулы и предшествует стадии зародышевого диска. Стадия бластоцисты относится к преимплантационному периоду развития, то есть самому раннему периоду эмбриогенеза млекопитающих (до прикрепления зародыша к стенке матки).

2) перенесение направления поисков со специфических антигенов сперматозоидов на их уникальные поверхностные структуры, участвующие в биоэнергетических процессах (превращение АТФ в цАМФ, фосфорилирование белков и др.) и обеспечивающие реализацию физиологических функций клеток, в частности, на ионные каналы CatSper, избирательно проницаемые для ионов кальция [10, 47].

Вакцины, нарушающие формирование зародыша и его имплантацию в матку

Вакцины для регуляции фертильности вышеописанных типов (ориентированные на блокирование образования гамет и нарушающие их функцию) создают условия, препятствующие оплодотворению яйцеклетки и превращению ее в зиготу¹⁵. Однако уже более 40 лет идет разработка вакцин с принципиально иным механизмом снижения фертильности людей — вызывающих прерывание уже развившейся беременности, т.е. аборт. Мишенью разработчиков таких вакцин стали процессы формирования зародыша и имплантации его в матку.

В предимплантационном развитии зародыша зигота, сформировавшаяся после оплодотворения яйцеклетки, выполняет серию делений и дифференциаций клеточной структуры (образование морулы, бластулы), в результате чего образуется бластоциста¹⁶ — шар, состоящий из нескольких сотен клеток. Размер бластоцисты у человека 0,1 мм. Бластоциста состоит из двух клеточных популяций: трофобласта (трофэктодермы) и эмбриобласта (внутренней клеточной массы). Трофобласт формирует внешний слой эмбриона — полый шар или пузырек. Эмбриобласт формирует внутренний слой бластоцисты, располагается внутри трофобластического пузырька в виде скопления клеток у одного из полюсов шара (внутренняя клеточная масса). Трофобласт участвует в имплантации (прикрепление эмбриона к эпителию матки, инвазия внутрь эндометрия матки, иммуносупрессорное действие, разрушение кровеносных сосудов), а также в формировании эктодермы ворсинок хориона (эктодермальная часть плаценты). Эмбриобласт дает начало телу плода, а также мезодермальным и эктодермальным структурам внезародышевых органов (желточному мешку, аллантоису, амниону, мезодермальной части хориона) [7].

В формировании зародыша и имплантации его в матку участвуют не менее 76 цитокинов, хемокинов, факторов роста, интегринов и других факторов белковой и гликопротеиновой природы (табл. 5). A.R. Lemons, R.K. Naz [26] распределили их на пять групп, в зависимости от стадии беременности (рис. 10).

Таблица 5. Цитокины, хемокины и другие факторы, регулирующие развитие беременности [26]

Белок		ММ, кДа	Ген человека	Роль в развитии беременности
1	2	3	4	5
Интерлейкины	IL-1 альфа	18	IL1A	Вызывает изменения в адгезии и инвазии
	IL-1 бета	17,5	IL1B	То же + стимуляция продукции IL-8
	IL-1 рецептор антагонист (IL-1Ra)	17,0	IL1RN	Предотвращает адгезию
	IL-6	26	IL6	Стимулирует секрецию лептина и металлопротеазную активность
	IL-10	18	IL10	Снижает цитотоксическую активацию uNK-клеток
	IL-11	23	IL11	Запускает развитие децидуальной ткани (отпадающей оболочки матки)
	IL-12	75	IL12A/ IL12B	Иммуномодуляция
	IL-15	18	IL15	Регулирует экспрессию IL-8 и uNK-клеток
	IL-18	18	IL18	Увеличивает экспрессию перфорина и цитолитический потенциал uNK-клеток
	IL-23	21	IL23A/ IL12B	Иммуномодулятор, регулирует экспрессию IL-8
	IL-27	27	EBI3/IL30	Иммуномодулятор
	Фактор ингибирования лейкемии (LIF)	26	LIF	Регулирует экспрессию генов, важных для имплантации эмбриона (бластоцисты)
Колониестимулирующие факторы	Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF)	19	CSF3	Рекрутирует макрофаги в матку, чтобы подготовить ее для имплантации эмбриона
	Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF)	14,4	CSF2	Усиливает пролиферацию и жизнеспособность бластомеров
	Макрофагальный колониестимулирующий фактор (M-CSF)	36	CSF1	Рекрутирует макрофаги в матку, чтобы подготовить ее для имплантации эмбриона
Суперсемейство трансформирующих факторов роста бета (TGFβ Superfamily)	Активин A (Activin A)	24–28	INHBA	Способствует развитию децидуальной оболочки; предотвращает активацию Т-клеток
	Макрофагингибирующий цитокин (MIC-1)	25	GDF15	Регулирует миграцию/инвазию трофобластов и децидуализацию
	Трансформирующий фактор роста β1 (TGFβ1)	25	TGFB1	Регулирует развитие эмбриона
	Трансформирующий фактор роста β2 (TGFβ2)	25	TGFB2	То же
	Трансформирующие факторы роста β3 (TGFβ3)	25	TGFB3	Регулируют Т-клеточные ответы
Семейство факторов некроза опухоли (TNF Family)	Фактор некроза опухоли α (TNFα)	25	TNF	Иммуномодулирующее действие. Высокий уровень TNFα приводит к токсическому эффекту
	Фактор некроза опухоли, слабый индуктор апоптоза (TWEAK)	17	TWEAK	Контроль цитотоксичности, возможно, через IL-15 и IL-18

Продолжение табл. 5

1	2	3	4	5
Гормоны	Гормон роста (GH)	22	GH1/GH2	Способствует нормальному развитию эмбриона
	Пролактин (PRL)	24	PRL	Способствует развитию децидуальной оболочки
Хемокины	CCL-2 (MCP-1)	11	CCL2	Рекрутирует в эндометрий моноциты, макрофаги и Т-клетки
	CCL-3 (MIP-1 α)	7,9	CCL3	Рекрутирует макрофаги
	CCL-4 (MIP-1 β)	7,62	CCL4	Рекрутирует макрофаги и NK-клетки, способствует миграции трофобласта
	CCL5 (RANTES)	8	CCL5	Рекрутирует макрофаги и NK-клетки. Снижает их количество, когда это необходимо для имплантации эмбриона
	CCL-7 (MCP-3)	8,5	CCL7	Рекрутирует макрофаги и NK-клетки либо подавляет их при имплантации эмбриона
	CXCL1 (GRO1; KC)	11	CXCL2	Тормозит воспалительный ответ
	IL-8 (CXCL8)	8,5	IL8	Регулирует экспрессию генов воспалительного ответа
	CX3CL1 (fractalkine)	90	CX3CL1	Рекрутирует макрофаги и NK-клетки, способствует миграции трофобласта, регулирует экспрессию генов адгезии
Семейство факторов эпидермального роста (EGF family)	Амфирегулин (AREG)	9,5–16,5	AREG	Регулируется через LIF, необходим для имплантации эмбриона
	Эпидермальный фактор роста (EGF)	6	EGF	Стимулирует миграцию/инвазию трофобласта внутрь эндометрия матки
	Гепаринсвязывающий EGF-подобный фактор роста (HB-EGF)	22	HB-EGF	Регулируется через LIF, способствует развитию бластоцисты
	Трансформирующий фактор роста α (TGF α)	17	TGFA	Увеличивает скорость расширения бластоцели
Факторы роста	Acrogranin/progranulin	68	GRN	Способствует адгезии, росту и дифференциации бластоцисты
	Основной фактор роста фибробластов (FGF2, bFGF)	18–22	FGF2	Готовит бластоцисту к перемещению к эпителию матки
	Фактор роста соединительной ткани (CTGF)	38	CTGF	Регулирует функцию матки
	Фактор роста гепатоцитов (HGF)	78	HGF	Регулирует дифференцировку цитотрофобласта и глубину инвазии внутрь эндометрия матки
	Фактор роста тромбоцитов (PDGF-A)	16	PDGFA	Способствует росту трофобласта
	Prokineticin 1 (PROK1)	9,5	EGVEGF	Вызывает экспрессию генов, отвечающих за имплантацию эмбриона (т.е. LIF)
	Фактор роста эндотелия сосудов (VEGFA)	45	VEGFA	Поддерживает corpus luteum (желтое тело)
Интегрины	$\alpha 4\beta 1$	280	ITGA4/ITGB1	Важен для имплантации эмбриона в матку и развития децидуальной оболочки
	$\alpha 5\beta 1$	265	ITGA5/ITGB1	Имеет важное значение для миграции вне ворсинчатых трофобластов (IFG-I-индуцированной)
	$\alpha 9\beta 1$	230	ITGA9/ITGB1	Важен для имплантации эмбриона в матку
	$\alpha v\beta 3$	230	ITGAV/ITGB3	Участвует в EVT миграции, важен для имплантации эмбриона в матку и развития децидуальной оболочки

Продолжение табл. 5

1	2	3	4	5
Другие факторы	Адреномедуллин	6	ADM	Участвует в инвазии и в формировании pinopode
	α -фетопротеин	70	AFP	Блокирует иммунный ответ
	Cochlin (COCH)	60	COCH	Маркер восприимчивости матки
	Кортикотропин-релизинг-гормон (CRH)	5	CRH	Способствует имплантации эмбриона через регуляцию экспрессии FasL
	Циклооксигеназа-2 (COX-2)	72	PTGS2	Участвует в синтезе простагландинов. Необходимо для оплодотворения, имплантации эмбриона в матку и развития децидуальной оболочки
	Цитоплазматическая фосфолипаза A2 α (cPLA2 α)	85	cPLA2 α	Участвует в синтезе арахидоновой кислоты, необходимой для имплантации эмбриона в матку
	Dickkopf-1 (DKK-1)	25	DKK1	Необходим для роста и адгезии бластоцисты
	Гликоделин	28	PAEP	Участвует в связывании сперматозоида с ооцитом и предотвращает развитие воспалительного ответа
	Гепарансульфатпротеогликан (HSPG)	500	Нет данных	Участвует в имплантации бластоцисты к стенке матки
	Человеческий хорионический гонадотропин (hCG)	37,6	CGB	Очень широкий спектр действия, в том числе лютеинизирующая и фолликулостимулирующая активность (см. в тексте статьи)
	Homeobox A10 (HOXA-10)	40	HOXA10	Необходим для развития децидуальной оболочки и имплантации эмбриона в матку
	Homeobox A11 (HOXA-11)	35	HOXA11	Необходим для дифференциации стромальных и железистых клеток матки
	Immunoresponsive gene 1 homolog (IRG1)	52	IRG1	Необходим для имплантации эмбриона в матку
	Инсулин	5,8	INS	Усиливает клеточную дифференциацию на ранней стадии эмбриогенеза
	Инсулиноподобный фактор роста I (IGF-I)	7,65	IGF1	Способствует клеточному росту зародыша
	Инсулиноподобный фактор роста II (IGF-II)	7,5	IGF2	Участвует в созревании яйцеклетки и развитии эмбриона в стадии бластоцисты
	Инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок 1 (IGFBP-1)	25	IGFBP1	Ограничивает рост трофобластов и ингибирует IGF-I активность
	Инсулиноподобный фактор роста, связывающий белок 2 (IGFBP-3)	40	IGFBP3	Участвует в созревании яйцеклетки и развитии зародыша
	Индукцируемый интерфероном 17 кДа белок (ISG15)	17	ISG15	Возможно иммуномодулирующее действие. Появляется в эндометрии в ответ на имплантацию эмбриона

Окончание табл. 5

1	2	3	4	5
	Лептин	16	LEP	Участвует в развитии бластоцисты; опосредует инвазивность цитотрофобласта
	Рецептор лизофосфатидной кислоты 3 (LPA3)	40	LPA3	Регулирует восприимчивость матки к имплантации эмбриона
	L-селектин	43	SELL	То же
	Муцин 1 (MUC-1)	300	MUC1	Вовлечен в процесс присоединения эмбриона к эпителию матки
	Специфический гликопротеин фаллопиевой трубы (OVGP1; MUC-9)	120	OVGP1	Усиливает сцепление сперматозоида с zona pellucida яйцеклетки
	Фактор активации тромбоцитов (PAF)	524	Нет данных	Стимулирует раннее эмбриональное развитие
	Преимплантационный фактор (PIF)	0,6–1,8	Нет данных	Регулирует иммунитет, способствует адгезии и инвазии бластоцисты, а также регулирует процессы апоптоза
	Простагландин E2 (PGE2)	352	Нет данных	Участвует в воспалительной реакции в эндометрии, необходимой для имплантации эмбриона
	Секретируемый фосфопротеин 1 (SPP1)	44	SPP1	Необходим для имплантации эмбриона
	Трофинин	69	TRO	Участвует в активации трофэктодермы для адгезии




Рисунок 10. Схематическое изображение этапов формирования зародыша и имплантации его в матку. Жирным шрифтом выделены факторы белковой природы, регулирующие развитие беременности, рассматриваемые специалистами в качестве перспективных антигенов для конструирования контр-рецептивных вакцин [26]

Наибольшие усилия разработчиков вакцин фертильности, вызывающих прерывание беременности, были сосредоточены на вакцине, использующей в качестве антигенного компонента HCG. Данное направление развивается с начала 1970-х гг. [36, 69].

Молекулу HCG формируют 237 аминокислот, ММ 36,7 кДа. По химическому строению он является гликопротеином. Альфа-субъединица HCG полностью гомологична альфа-субъединицам FSH, LH и тиреотропного гормона. Бета-субъединица HCG уникальна именно для него. Поэтому все усилия создать контрацептивные вакцины на основе HCG сосредоточены на бета-субъединице HCG. Роль HCG в развитии беременности показана на рис. 11.

Конструирование контрацептивных вакцин на основе HCG началось с работ Talwar et al. [72] и Stevens et al. [65, 66]. Первая группа исследователей использовала в качестве антигена целую бета-субъединицу HCG (бета-HCG-вакцина), вторая (пользовавшаяся поддержкой ВОЗ) — ее усеченный вариант (СТР-вакцина; carboxy terminal peptide), соответствующий 37 аминокислотным последовательностям от карбоксильного конца бета-HCG. ММ такого СТР-фрагмента HCG 3 тыс. кДа. Необходимость использования СТР обосновывалась наличием общих участков в первичной структуре HCG и LH. Разработчики вакцин опасались, что антитела к HCG будут блокировать функцию LH (см. выше), 33 аминокислотные последовательности со стороны С-конца HCG не имели сходства с LH. Первую фазу клинических исследований¹⁷ СТР-вакцина прошла в конце 1990-х гг. За шесть месяцев наблюдения за вакцинированными женщинами не было выявлено никаких осложнений [23, 64].




Рисунок 11. Роль HCG в развитии беременности. Антитела к HCG предотвращают имплантацию эмбриона в матку [70]

Еще одним подходом к снижению антигенного сходства между бета-субъединицами HCG и LH было частичное нарушение конформации бета-субъединицы HCG. Для этого расщепались и алкилировались три внутрицепочечные дисульфидные группы и полученное производное бета-субъединицы сшивали с иммуностимулирующим носителем. Антигенные свойства HCG снижались, но антигенное сходство с LH утрачивалось полностью. При расщеплении всех шести внутрицепочечных дисульфидных связей антигенные свойства HCG утрачивались [4]. Данное направление конструирования HCG-вакцин дальнейшего развития не получило.

Бета-субъединица HCG и ее СТР-производные (впоследствии были использованы фрагменты протяженностью в 45 и 53 аминокислоты [70]) оказались слабыми антигенами. Поэтому их сшивали с дифтерийным (DT) и столбнячным (TT) токсоидами и добавляли к адьюванту. Среди иммуностимулирующих носителей наибольшим предпочтением у исследователей пользовался нативный столбнячный токсид, так как эти вакцины предполагалось использовать и для профилактики столбняка в Индии, где он тогда был широко распространен среди женщин и новорожденных детей. СТР-вакцины использовали вместе с сильными адьювантами (адьювант Фрейнда, сквален, Arlcel A) [70].

Значительно большую антигенную активность, чем СТР-вакцины, показали вакцины, включающие целый бета-HCG, сшитый со столбнячным токсидом и сорбированный на гидроокиси алюминия. Авидность антител к рецептору HCG, вырабатывавшихся в ответ на введение такой вакцины, была на порядок выше, чем у антител, образовавшихся после введения СТР-вакцины [70]. Первая фаза клинических исследований бета-HCG-вакцины проведена в конце 1990-х гг. в Финляндии, Швеции, Чили и Бразилии под патронажем International Committee on Contraception Research of the Population Council. У вакцинированных женщин сохранялся регулярный менструальный цикл и овуляция. Отклонений со стороны гормональных и гематологических показателей не отмечено. В то же время выявился серьезный недостаток таких вакцин — большая разница в титрах антител к HCG у вакцинированных, что предполагает вариабельность результатов при массовых вакцинациях [70].

Неудача бета-HCG-вакцины послужила толчком к поиску путей повышения антигенных свойств бета-субъединицы HCG. Эффективным подходом к решению данной задачи стало получение гибридного HCG, состоящего из бета-субъединицы HCG и альфа-субъединицы хорионического гонадотропина овечьего происхождения. Гибрид сшивали со столбнячным токсидом и сорбировали на гидроокиси алюминия [73]. Вакцина получила обозначение HSD, т.е. гетероспецифический димер (heterospecies dimer). В понимании ее

¹⁷ В первую фазу клинических исследований вакцин входит изучение их реактогенности, безопасности и специфической активности на ограниченных контингентах людей.

разработчиков вакцинация дала хорошие результаты. Титр антител, препятствующий развитию беременности, сохранялся после каждой бустерной вакцинации в среднем 3 месяца (от 6 недель до 6 месяцев). Женщины восстанавливали фертильность после того, как концентрация антител к HCG в сыворотке крови падала ниже 35 нг/мл. Вакцинация женщин обеими вакцинами, бета-HCG-ТТ и HSD-ТТ/DT, приводила к образованию антител, перекрестно реагирующих с человеческим LH. Однако осложнений, связанных с блокированием, LH (см. выше), во время второй фазы клинических исследований¹⁸, проведенных в Индии в конце 1990-х гг., обнаружено не было. HSD-вакцина считалась в то время лучшей из трех исследованных (СТР-вакцина, бета-HCG-вакцина, HSD-вакцина) [69, 70, 72].

Однако до настоящего времени контрацептивные вакцины на основе HCG в коммерческую реализацию не поступили. R.K. Naz [41] объясняет это невозможностью достичь высоких титров антител. Но и высокие титры антител к HCG, когда их удастся создать, не решают проблему коммерческой непригодности вакцины. В описании к патенту, опубликованному после завершения второй фазы клинических испытаний такой вакцины в Индии, утверждается, что при высоких титрах антител к HCG они блокируют LH и вызывают образование иммунных комплексов со всеми последующими осложнениями. Сами авторы предлагали контрацептивную вакцину на основе рецептора к HCG [56], но в последующие годы это направление не получило развития, видимо, из-за его сложности.

Признаки скрытого применения вакцин контрацепции

Сообщения о скрытых массовых вакцинациях контрацептивными вакцинами приходили из Пакистана [78], Индонезии и стран Латинской Америки [12].

Российское законодательство в области контроля качества иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) построено так, что контролирующая организация на этапе доклинического исследования проверяет препарат по показателям, определенным самим производителем. Качество лекарственного средства — соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа¹⁹. Поэтому искать стерилизующий компонент в вакцине никто не будет, если он не заявлен в нормативном документе как один из показателей ее качества (!). Закупки вакцин для массового применения осуществляются по тендеру. Его выигрывает поставщик, предложивший лучшие условия покупателю. Но заподозрить такую вакцинацию все же можно на основании такого косвенного признака, как навязываемые населению репродуктивного возраста под явно надуманными предлогами частые вакцинации и ревакцинации.

Антигены, используемые в контрацептивных вакцинах, не дают высоких титров специфических антител на период более 1,5–2 лет. Если в этот промежуток времени не произойдет поражения специфическими антителами органов репродуктивной системы (характерно для вакцин, использующих в качестве антигенов GnRH, LH, FSH, ZP), то фертильность человека восстанавливается. Чтобы этого избежать, под предлогом вакцинации от столбняка женщинам в Никарагуа, на Филиппинах и в Мексике трижды, с промежутками в несколько месяцев вводили вакцину с HCG, конъюгированную со столбнячным анатоксином. Наличие HCG в вакцине подтверждено лабораторными методами исследования. Для реальной профилактики заболевания столбняком введение противостолбнячной вакцины пациенту делается однократно, с временным интервалом не менее 10 лет [12]. Следует знать того, кто стоит за вакцинацией, кто ее инициатор, кто реальный производитель вакцин и состояние его производственных мощностей. Если вакцинацией занимается какая-то неправительственная западная организация, вакцина предлагается бесплатно, в рамках гуманитарной помощи и т.п., то это уже должно настораживать вакцинируемых, так как бесплатных вакцин не бывает, их производство и реализация — весьма прибыльный бизнес; а сама организация-гуманист может оказаться частью сетевой структуры, контролируемой правительством, не желающим огласки.

Прямые доказательства скрытого использования контрацептивных вакцин можно получить путем исследования состава вакцин, используемых для массовых вакцинаций населения, и обнаружения в них незаявленных производителем антигенных компонентов, включаемых только в контрацептивные вакцины (табл. 1). Не обязательно, что такие вакцины поступят на рынок в результате саботажа. Возможна халатность или беспринципность, когда дешевая основа вакцины, предназначенной для кастрации хряков, будет продана производителю как основа для дифтерийных и столбнячных вакцин медицинского применения.

Уже осуществленное скрытое применение вакцин контрацепции можно предположить по совокупности следующих признаков: 1) наличие в сыворотке крови вакцинированного пациента антител к антигенным компонентам, используемым только в контрацептивных вакцинах (табл. 1), в норме в сыворотке людей антител к таким антигенам не бывает, за исключением случаев, связанных с бесплодием; 2) изменение гормонального фона вакцинированного пациента; 3) нарушения функционирования и патогистологические изменения в органах репродуктивной системы пациента, развившиеся в течение 3 и более месяцев после вакцинации (табл. 6).

Сообщения о скрытых массовых вакцинациях контрацептивными вакцинами не являются домы-

¹⁸ Во вторую фазу клинических исследований вакцин входит изучение их безопасности, иммунологической и антифертильной эффективности на расширенных контингентах людей.

¹⁹ Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» // Российская газета. — 2010, 14 апреля. — № 5157.

Таблица 6. Признаки осуществленного скрытого применения вакцин контрацепции*

Антиген/ мишень	Длитель- ность цирку- лирования специфиче- ских антител	Изменения гормонального фона	Патогисто- логические изменения в органах ре- продуктивной системы	Изменения в функциони- ровании ре- продуктивной системы	Примечание
GnRH/мужская часть населе- ния	До полугода	В сыворотке кро- ви вакцинирован- ного в течение нескольких не- дель значительно понижается уро- вень тестостеро- на, LH, FSH	Пикнотизиру- ются клетки Лейдига, их количество со- кращается, ати- пичная форма сперматозоидов (утрата голов- ки, дефекты акросомы и др., см. табл. 2)	Снижается вес и уменьшаются размеры семен- ников, проста- ты, нарушается сперматогенез, развивается импотенция	Такие вакцины могут появиться на рынке под ви- дом дифтерийных и столбнячных путем подмены основы компо- нентами для про- изводства вете- ринарных вакцин типа Improvac®
LH/мужская часть населе- ния	То же	В сыворотке крови вакциниро- ванного в тече- ние нескольких недель значи- тельно пони- жается уровень тестостерона	Уменьшение в семенных ка- нальцах тести- кул количества сперматид и сперматоцитов, редукция яичек	Азооспермия, импотенция	LH не имеет строгой видоспе- цифичности
FSH/мужская часть населе- ния	До 2 лет	Концентрация в сыворотке крови LH, тиреотроп- ного гормона, тестостерона, тироксина, трийодтиронина остается в норме. FSH не обнаружи- вается	Снижение пролиферации сперматогоний и продукции сперматоцитов	Ухудшение каче- ственных пока- зателей спермы (см. табл. 2), оли- гозооспермия, появление в яэ- куляте незрелых сперматозоидов, импотенция	То же
ZP/женская часть населе- ния	До 2 лет	Непоказательные изменения	Дегенератив- ные изменения яичников	Оофорит, нару- шение менстру- ального цикла	См. примеча- ние для GnRH. Бесплодие может сохраниться и после исчезно- вания антител из сыворотки крови
RH-20/мужская часть населе- ния	Нет данных	То же	Воспалительные изменения в тестикулах	Аутоиммунный орхит, отсутствие сперматозоидов в придатке яичка	–
HCG/женская часть населе- ния	До полугода	То же	Нет данных	Нет данных	Имеется инфор- мация об исполь- зовании проти- востолбнячных вакцин с конъю- гированным HCG для стерилизации женщин в странах третьего мира

Примечание: * — интерпретация приведенных в таблице данных может осуществляться только специ-
алистами с учетом анамнеза и наследственности пациента.

слами «антивакцинаторов» и «исламских фанатиков». Упомянутая в известной книге F. Engdahl [12] вакцинация населения стран третьего мира осуществлялась вакциной, содержащей в качестве антигена HCG. Но это только одно и не самое опасное направление их конструирования, о чем автор не догадывается. Всего на сегодняшний день развиваются три принципиально различающихся направления создания вакцин фертильности, а в их рамках разрабатывается не менее 12 частных подходов к конструированию таких вакцин. Для проведения массовых вакцинаций населения вакцинами фертильности у сетевых организаций имеются огромные ресурсы: научные — знание тонких механизмов регуляции фертильности человека; организационные — разветвленная сеть фондов и неправительственных организаций; правовые — подогнанная под интересы транснациональных фармацевтических корпораций законодательная база в области оборота лекарственных средств; информационные и коррупционные — примером их объединения можно считать настойчивое нагнетание СМИ атмосферы страха перед псевдопандемиями свиного и птичьего гриппа. Открыто существует и идеологическая база, обосновывающая необходимость массового сокращения населения — неомальтузианство. ВОЗ не является организацией с безукоризненной репутацией. Вакцинация «HCG + столбняк» в странах третьего мира проводилась под эгидой этой организации.

Отказаться от такого мощного средства специфической профилактики инфекционных болезней, как вакцинация, нельзя, потому что это приведет к созданию условий для массового распространения инфекционных болезней, сегодня контролируемых вакцинацией. Но и игнорировать возможность использования массовых вакцинаций для скрытой стерилизации населения — значит перестать защищать себя и будущее своих детей и внуков. Необходимо серьезно переосмыслить подходы к доклиническому исследованию ИПП и восстановить государственный контроль над их производством, существовавший в советское время. Целесообразно запретить ввоз в Россию контрацептивных вакцин ветеринарного назначения, если они содержат в качестве иммуностимулирующего носителя антигены, используемые в вакцинах медицинского назначения.

Список литературы

1. Aitken R.J., Rudak E.A., Richardson D.W., Dor J. et al. *The influence of anti-zona and anti-sperm antibodies on sperm-egg interactions* // *J. Reprod. Fert.* — 1981. — V. 62. — P. 597-606.
2. Anil Suri. *Sperm specific proteins-potential candidate molecules for fertility control* // *Reproduc. Biol. Endocrin.* — 2004. — V. 2 (электронный ресурс: <http://www.rbej.com/content/2/1/10>).
3. Anthony M.B., Roger A., Bulter C. WO 91/04052. *Vaccines* // *Peptide Technology Ltd.* (Австралия). Заявл. 22.09.1989; опублик. 04.04.1991.
4. Bahl O.P. GB2051081. *Antigen for early pregnancy test and contraceptive vaccine* // *Research Corp.* (США). Заявл. 06.02.1978; опублик. 14.01.1981.
5. Baskin M.J. *Temporary sterilization by injection of human spermatozoa: a preliminary report* // *Am. J. Obstet. Gynecol.* — 1932. — V. 24. — P. 892-897.
6. Baskin M.J. US2103240. *Nonspecific spermatoxic vaccine and process of producing same* (США). Заявл. 07.08.1935; опублик. 28.12.1937.
7. Blastocyst. Электронный ресурс <http://en.wikipedia.org/wiki/Blastocyst>.
8. Bowen R.L. NZ533463 (A). *Methods for slowing senescence and treating and preventing diseases associated with senescence* // *Voyager Pharmaceutical Corp* (США). Заявл. 19.12.2002; опублик. 23.02.2007.
9. Brown R., Mansour M., Pohajdak B. EP1474447 (A2). *Antigens for immunocontraception* // *Immunovaccine Technologies Inc.* (Канада). Заявл. 08.02.2002; опублик. 10.11.2004.
10. Calcium channel. Электронный ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_channel.
11. Edwards R.G. *Immunological control of fertility in female mice* // *Nature.* — 1964. — V. 203. — P. 50-53.
12. Engdahl F. *Seeds of Destruction. The Hidden Agenda of Genetic Manipulation.* — Centre for Research on Globalization Publishing, 2007.
13. Govind C.K., Gupta S.K. *Failure of female baboons (Papio anubis) to conceive following immunization with recombinant non-human primate zona pellucida glycoprotein-B expressed in Escherichia coli* // *Vaccine.* — 2000. — V. 18. — P. 2970-2978.
14. Grimes S., Dov M., Vernon S. US2005112721 (A1) *Chimeric peptide immunogens* // Grimes S., Dov M., Vernon S. (США). Заявл. 05.05.2000; опублик. 26.05.2005.
15. Gupta J.C., Raina K., Talwar G.P. et al. *Engineering, cloning and expression of genes encoding the multimeric luteinizing-hormone-releasing-hormone linked to T-cell determinants in Escherichia coli* // *Protein Express. Purif.* — 2004. — V. 37. — P. 1-7.
16. Gupta S.K., Jethanandani P., Afzalpurkar A., Kaul R. et al. *Prospects of zona pellucida glycoproteins as immunogens for contraceptive vaccine* // *Human Reproduction Update.* — 1997. — V. 3, № 4. — P. 311-324.
17. Hans M.R., Berendina O.H. US20040166118. *Peptide, immunogenic composition and vaccine or medical preparation, a method to immunize animals against the hormone LHRH, and analogs of the LHRH tandem repeat peptide and their use as vaccine* // Hans M.R., Berendina O.H., Pepscan Systems B.V. (Нидерланды). Заявл. 07.06.1995; опублик. 26.08.2004.
18. Hilbe M., Jaros P., Ehrensperger F. et al. *Histomorphological and immunohistochemical findings in testes, bulbourethral glands and brain of immunologically castrated male piglets* // *Schweiz. Arch. Tierheilkd.* — 2006. — V. 148, № 11. — P. 599-608.
19. Hsu C.T., Ting C.Y., Ting C.J., Chen T.Y. et al. *Vaccination against gonadotropin-releasing hormone (GnRH) using toxin receptor-binding domain-conjugated GnRH repeats* // *Cancer Res.* — 2000. — V. 60. — P. 3701-3705.
20. Jeyakumar M., Moudgal N.R. *Immunization of male rabbits with sheep luteal receptor to luteinizing hormone results in production of antibodies exhibiting hormone agonistic and antagonistic activities* // *J. Endocrinol.* — 1996. — V. 150. — P. 431-443.

21. Jeyakumar M., Suresh R., Krishnamurthy H.N. et al. Changes in testicular function following specific deprivation of luteinizing hormone in the adult male rabbit // *J. Endocrinol.* — 1995. — V. 147. — P. 111-120.
22. Jones G.R., Sacco A.G., Subramanian M.G. et al. Histology of ovaries of female rabbits immunized with deglycosylated zona pellucida macromolecules of pigs // *J. Reproduct. and Fertil.* — 1992. — V. 95. — P. 513-525.
23. Jones W.R., Judd S.J., Ing R.M.Y. et al. Phase I clinical trial of a world health organisation birth control vaccine // *The Lancet.* — 1998. — V. 331, Is. 8598. — P. 1295-1298.
24. Kerr P.J., Jackson R.J., Robinson A.J. et al. Infertility in female rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) alloimmunised with the rabbit zona pellucida protein ZPB either as a purified recombinant protein or expressed by recombinant myxoma virus // *Biol. of Reproduct.* — 1999. — V. 61. — P. 606-613.
25. Landsteiner K. Zur Kenntnis der spezifisch auf blutkörperchen wirkenden sera // *Zb. Bakt.* — 1899. — V. 25. — P. 546-549.
26. Lemons A.R., Naz R.K. Contraceptive vaccines targeting factors involved in establishment of pregnancy // *Am. J. Reprod. Immunol.* — 2011. — V. 66, № 1. — P. 13-25.
27. Liskin L., Pile J.M., Quillan W.F. Vasectomy safe and simple // *Popul. Rep.* — 1983. — V. 4. — P. 61-100.
28. Luteinizing hormone. Электронный ресурс: http://en.wikipedia.org/wiki/Luteinizing_hormone.
29. Malthusianism. Электронный ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/Malthusianism#Modern_Malthusianism.
30. Martinez M.L., Harris J.D. Effectiveness of zona pellucida protein ZPB as an immunocontraceptive antigen // *J. Reprod. Fertil.* — 2000. — V. 120. — P. 19-32.
31. Meloen R.H., Wensing C.J. EP0464124 (A1). A peptide, immunogenic composition and vaccine or medicinal preparation / Stichting Centr. Diergeneeskund (Нидерланды). Заявл. 23.03.1989; опубл. 08.01.1992.
32. Metchnikoff E. Etudes sur la resorption de cellule // *Ann. Inst. Pasteur.* — 1899. — V. 13. — P. 737-779.
33. Miller L.A., Fagerstone K.A., Wagner D.C. et al. Factors contributing to the success of a single-shot, multiyear PZP immunocontraceptive vaccine for white-tailed deer // *Human-Wildlife Conflicts.* — 2009. — V. 3, № 1. — P. 103-115.
34. Moudgal N.R., Ravindranath N., Aravindan G.R. et al. Anti-FSH antibody as a probe in determining the role of FSH in the maintenance of gonadal function in the primate / Ed. by Rosenwaks Z., Spieler J.M. // *Nonsteroidal Gonadal Factors: Physiological Roles and Possibilities in Contraceptive Development.* — CONDRAD Program, 1988. — P. 249.
35. Moudgal N.R., Sairam M.R., Krishnamurthy H.N. et al. Immunization of male bonnet monkeys (*M. radiata*) with a recombinant FSH receptor preparation affects testicular function and fertility // *Endocrinol.* — 1997. — V. 138. — P. 3065-3068.
36. Moudgall N.R., Sheela Rani C.S. Advances in immunology of gonadotropins / Ed. by C.H. Li // *Hormonal Proteins and Peptides.* — New York: Academic Press, 1983. — P. 135.
37. Moudgall N.R., Jeyakumar M., Krishnamurthy H.N. et al. Development of male contraceptive vaccine — a perspective // *Human Reproduction Update.* — 1997. — V. 3, № 4. — P. 335-346.
38. Murthy G.S., Srilatha N.S. Mapping of assembled epitope with microgram qualities of antigen: identification of an epitope at the receptor binding region of human follicle stimulating hormone // *Curr. Sci.* — 1996. — V. 70. — P. 1019-1022.
39. Murty G.S., Sheela Rani C.S., Moudgal N.R. et al. Effect of passive immunization with specific antiserum to FSH on the spermatogenic process and fertility of adult male bonnet monkeys (*Macaca radiata*) // *J. Reprod. Fertil.* — 1979. — V. 26. — P. 147-163.
40. Naz R.K. Antisperm contraceptive vaccines: where we are and where we are going? // *Am. J. Reprod. Immunol.* — 2011a. — V. 66. — P. 5-12.
41. Naz R.K. Contraceptive vaccines: success, status, and future perspective // *Am. J. Reprod. Immunol.* — 2011. — V. 66. — P. 2-4.
42. Naz R.K. Development of genetically engineered human sperm immunocontraceptives // *J. Reprod. Immunol.* — 2009. — V. 83, № 1-2. — P. 145-150.
43. Naz R.K. Immunocontraceptive effect of Izumo and enhancement by combination vaccination // *Mol. Reprod. Dev.* — 2008. — V. 75. — P. 336-344.
44. Naz R.K. Status of contraceptive vaccines // *Am. J. Reprod. Immunol.* — 2009. — V. 61, № 1. — P. 1-18.
45. Naz R.K., Chauhan S.C. Human sperm-specific peptide vaccine that causes long-term reversible contraception // *Biol. Reproduce.* — 2002. — V. 67. — P. 674-680.
46. Naz R.K., Gupta S.K., Gupta J.C. et al. Recent advances in contraceptive vaccine development: a mini-review // *Hum. Reprod.* — 2005. — V. 20, № 12. — P. 3271-3283.
47. Nazari M., Mirshahi M., Mowla S.J. et al. Investigation in vitro expression of CatSper subfragment followed by production of polyclonal antibody: potential candidate for the next generation of non hormonal contraceptive // *Cell. J.* — 2012. — V. 14, № 3. — P. 215-24.
48. Nieschlag E. Reasons for abandoning immunization against FSH as an approach to male fertility regulation / Ed by Zatuchni G.I., Goldsmith A., Spieler J.M., Sciana J.J. // *Male contraception: Advances and Future prospects. Professional Series on Fertility Regulation.* — Philadelphia: Harper and Row, 1985. — P. 395.
49. Ohl D., Naz R.K. Infertility due to antisperm antibodies // *J. Urol.* — 1995. — V. 46. — P. 591-602.
50. Pau K.Y., Spie H.G. Neuroendocrine signals in the regulation of gonadotropin-releasing hormone secretion // *Chin. J. Physiol.* — 1997. — V. 31, № 40. — P. 181-196.
51. Potter A.A., Manns J.G. NZ333999 (A). GnRH-leukotoxin chimeric proteins for use in vaccines. — Univ. Saskatchewan (Канада). Заявл. 08.09.1996; опубл. 28.07.2000.
52. Rockefeller Foundation. Электронный ресурс http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation.
53. Roy B.M. WO 88/01176. Regulating animal reproduction // *Bunge Australia.* Заявл. 18.08.1986; опубл. 25.02.1988.
54. Sacco A.G., Pierce D.L., Subramanian M.G. et al. Ovaries remain functional in squirrel monkeys (*Saimiri sciureus*) immunized with porcine zona pellucida 55 000 macromolecule // *Biol. Reproduct.* — 1987. — V. 36. — P. 481-490.
55. Saenziturriaga L. US2012093846 (A1). Protein for the immunocastration for mammals // Saenziturriaga L. (Чили). Заявл. 15.04.2009; опубл. 19.04.2012.
56. Saxena B.B., Rathnam P. US2005/0032171. hCG-hLH receptor and hCG-hLH receptor-hCG complex as antigens, antibodies thereto and contraceptive vaccine // *Cornell Res. Foundation Inc. (США).* Заявл. 11.03.1993; опубл. 10.02.2005.

57. Schanbacher B.D. Effects of active immunization of the ram and bull against luteinizing hormone // *Thenogenology*. — 1985. — V. 24, № 1. — P. 59-71.
58. Sheela Rani C.S., Murty G.S.R.C., Moudgal N.R. Effect of chronic neutralization of endogenous FSH on testicular function in the adult male bonnet monkey — assessment using biochemical parameters // *Int. J. Androl*. — 1978. — V. 1. — P. 489-500.
59. Shirubaasa D.D., Maafui B.D., Meipurutofuto R.J. et al. JPH02113 (A). Agent and method for stimulating immune response to GnRH to immunologically make mammal sterile. — Univ. Saskatchewan (Канада). Заявл. 30.09.1987; опубл. 01.05.1990.
60. Skrlep M., Segula B., Zajec M. et al. Effect of immunocastration (Improvac®) in fattening pigs I: growth performance, reproductive organs and malodorous compounds // *Slov. Vet. Res.* — 2010. — V. 47, № 2. — P. 57-64.
61. Spieler J. Development of immunological methods of fertility regulation // *Bulletin of the World Health Organization*. — 1987. — V. 65, № 6. — P. 779-783.
62. Srinath B.R., Wickings E.J., Witting C., Nieschlag E. Active immunization with follicle stimulating hormone for fertility control: a 4,5 year study in male rhesus monkeys // *Fertil. Steril*. — 1983. — V. 40. — P. 110-117.
63. Srivastava N., Santhanam R., Sheela P. et al. Evaluation of the immunocontraceptive potential of *Escherichia coli*-expressed recombinant dog ZP2 and ZP3 in a homologous animal model // *Reproduction*. — 2002. — V. 123. — P. 847-857.
64. Stevens V.C. Immunological approaches to fertility regulation // *Bull. WHO*. — 1978. — V. 56, № 2. — P. 179-192.
65. Stevens V.C., Cinader B., Powell J.E. et al. Preparation and formulation of a human chorionic gonadotropin antifertility vaccine: selection of adjuvant and vehicle // *Am. J. Reprod. Immunol*. — 1981. — V. 1. — P. 315-321.
66. Stevens V.C., Cinader B., Powell J.E. et al. Preparation and formulation of a human chorionic gonadotropin antifertility vaccine: selection of peptide immunogen // *Am. J. Reprod. Immunol*. — 1981. — V. 6. — P. 307-314.
67. Suresh R., Medhamurthy R., Moudgal N.R. Comparative studies on the effects of specific immunoneutralization of endogenous FSH or LH on testicular germ cell transformations in the adult bonnet monkey (*Macaca radiata*) // *Am. J. Reprod. Immunol*. — 1995. — V. 34. — P. 35-43.
68. Suresh R., Moudgal N.R. A role of nocturnal serum testosterone surge in regulating spermatogenesis in the adult non-human primate // *Endocrine*. — 1995. — V. 3. — P. 487-492.
69. Talwar G.P. Contraception-immunological / Ed. by Delves P.J., Roitt I. // *Encyclopaedia of Immunology*. — 2nd ed. — London: Academic Press, 1997.
70. Talwar G.P. Vaccines for control of fertility and hormone-dependent cancers // *Immunol. Cell Biol*. — 1997. — V. 75. — P. 184-189.
71. Talwar G.P., Chaudhuri M. K., Jayashankar R. GB2228262. Antigenic derivative of GnRH. — *Nat. Inst. Immunology* (Индия). Заявл. 05.04.1989; опубл. 22.08.1990.
72. Talwar G.P., Sharma N.C., Dubey S.K. et al. Isoimmunization against human chorionic gonadotropin with conjugates of processed β -subunit of the hormone and tetanus toxoid // *Proc. Natl. Acad. Sci.* — 1976. — V. 73. — P. 218-222.
73. Talwar G.P., Singh O., Rao L.V. An improved immunogen for anti-human chorionic gonadotropin vaccine eliciting antibodies reactive with a conformation native to the hormone without crossreaction with human follicle stimulating hormone and human thyroid stimulating hormone // *J. Reprod. Immunol*. — 1988. — V. 14. — P. 203-212.
74. Tollner T.L., Overstreet J.W., Branciforte D. et al. Immunization of female *Cynomolgus* macaques with a synthetic epitope of sperm-specific lactate dehydrogenase results in high antibody titres but does not reduce fertility // *Mol. Reprod. Dev.* — 2002. — V. 62. — P. 257-264.
75. Upadhyay S.N., Thillaikoothan P., Bamezai A. et al. Role of adjuvants in inhibitory influence of immunization with porcine zona pellucida antigen (ZP-3) on ovarian folliculogenesis in bonnet monkeys: a morphological study // *Biology of Reproduction*. — 1989. — V. 41. — P. 665-673.
76. Urbanski H. Differential roles of GnRH-I and GnRH-II neurons in the control of the primate reproductive axis // *Front. Endocrin.* — 2012. — V. 3. — Article 20 (doi: 10.3389/fendo.2012.00020).
77. Wassarman P.M. Zona pellucida glycoproteins // *The Jour. Biol. Chem.* — 2008. — V. 283, № 36. — P. 24285-24289.
78. Yousafzai S. Pakistan: Mullahs and Militants Keep Polio Alive: электронный ресурс <http://www.thedailybeast.com/articles/2012/12/19/pakistan-mullahs-and-militants-keep-polio-alive.html?url=/articles/2012/12/19/pakistan-mullahs-and-militants-keep-polio-alive.html>.
79. Zona pellucida. Электронный ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/Zona_pellucida.

Получено 03.12.13 □

Супотницький М.В.

Федеральна державна бюджетна установа «Науковий центр експертизи засобів медичного застосування» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, м. Москва

КОНТРАЦЕПТИВНІ ВАКЦИНИ

Резюме. Дослідження зі створення вакцин, що мають контрацептивний ефект, ведуться з кінця 1920-х рр. З 1972 р. контрацептивні вакцини є однією з пріоритетних програм Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction). У здійсненні програми бере участь Рокфеллерівський фонд (Rockefeller Foundation). Відкрито декларована мета створення таких вакцин — регуляція чисельності населення в країнах третього світу. На даний час склалися три основних напрямки конструювання

контрацептивних вакцин: 1) вакцини, орієнтовані на блокування вироблення гамет; 2) такі, що порушують їх функцію; 3) такі, що порушують процес запліднення. Контрацептивні вакцини вже понад 10 років широко використовуються для зниження фертильності й кастрації диких і свійських тварин. У комерційній реалізації знаходяться ветеринарні вакцини Equivac®, Improvac®, GonaCon®, Repro-BLOC (на основі гонадотропін-рилізінг-гормону); SprayVac™ і IVT-PZP® (на основі антигенів zona pellucida). Клінічні дослідження показали ефективну контрацептивну дію (у

жінок) вакцин, у яких як антиген використовується людський хоріонічний гонадотропін. У той же час виявлені й побічні дії таких вакцин: для вакцин, що містять як антигенні компоненти гонадотропін-релізінг-гормон і лютеїнізуючий гормон, — кастрація, розвиток імпотенції; для тих, що містять фолікулостимулюючий гормон, — олігоспермія; антигени *zona pellucida* — необоротний оофорит. У роботі обговорюються підходи до виявлення стерилізуючих компонентів у вакцинах, призначених для масової профілактики інфекційних хвороб, не заявлених виробниками, і наслідків їх застосування. Уже здійснене приховане застосування контрацептивних вакцин можна припустити: 1) за наяв-

ністю антитіл до їх антигенних компонентів (у не вакцинованих контрацептивними вакцинами людей таких антитіл не буває, за винятком випадків, пов'язаних із безплідністю); 2) за зміною гормонального фону вакцинованого пацієнта; 3) за порушенням функціонування й патогістологічними змінами в органах репродуктивної системи.

Ключові слова: азооспермія, антигени, сперматозоїди, антитіла, блискача зона ооцита, гонадотропін-релізінг-гормон, імуноконтрацепція, контрацептивна вакцина, лютеїнізуючий гормон, фолікулостимулюючий гормон, людський хоріонічний гонадотропін.

Supotnitsky M.V.

Federal State Budgetary Institution «Scientific Center for Expertise of Means of Medical Application» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow

CONTRACEPTIVE VACCINES

Summary. Researches to develop vaccines with contraceptive effect are being carried out since the 1920s. Since 1972, the contraceptive vaccines are one of the priority programs of the World Health Organization (WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction). Rockefeller Foundation participates in implementing the program. Openly declared objective of creating such vaccines — the regulation of the population in the Third World countries. There are currently three main directions of contraceptive vaccine design: 1) vaccines targeted at blocking the production of gametes; 2) impairing their function; 3) violating the fertilization process. Contraceptive vaccines for more than 10 years are widely used to reduce fertility and castration of wild and domestic animals. In the commercial realization there are veterinary vaccines Equity®, Improvac®, GonaCon®, ReproBLOC (based on gonadotropin-releasing hormone); SpayVac™ and IVT-PZP® (based on *zona pellucida* antigens). Clinical studies have shown effective contraceptive action (in women) of vaccines, in which human chorionic gonadotropin is used as an antigen. At

the same time, there are found the side effects of such vaccines: for vaccines containing gonadotropin-releasing hormone and luteinizing hormone as antigenic components — castration, impotence; for vaccines containing follicle stimulating hormone — oligospermia; *zona pellucida* antigens — irreversible oophoritis. This paper discusses approaches to detection of sterilizing components in vaccines intended for mass prevention of infectious diseases, not reported by manufacturers, and the consequences of their use. Hidden use of contraceptive vaccines, which already took place, can be detected: 1) by the presence of antibodies to their antigenic components (in unvaccinated by contraceptive vaccines people such antibodies do not exist, except infertility cases); 2) by change in the hormonal levels of the vaccinated patients; 3) by malfunction and histopathological changes in the reproductive organs.

Key words: azoospermia, antigens, sperm, antibodies, oocyte *zona pellucida*, gonadotropin-releasing hormone, immunocontraception, contraceptive vaccine, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, human chorionic gonadotropin.