Дементьев Г.П. 1951. Отряд хищные птицы Acipitres или Falconiformes // *Птицы Советского Союза*. М., **1**: 70-341.
Дмоховский А.В. 1933. Птицы Средней и Нижней Печоры // *Бюл. МОИП*. Нов. сер. Отд. биол. **42**, 2: 214-242.
Фортунатова К.Р. 1951. Методика изучения питания хищных рыб // *Зоол. журн.* **30**, 6.
Moll K.H. 1956-1957. Beiträge zur Forpflanzungsbiologie des Fischadlers // *Falke* 4/6 (1956), 1 (1957).
Mertens R. 1956. Geniesst der Fischadler ausreichenden Schutz? // *Natur und Landschaft* **31**, 1.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск **892**: 1728-1730*

Отлов дупелей *Gallinago media* на токах

В.Н.Карпович, Я.В.Сапетин

*Второе издание. Первая публикация в 1958**

В старой русской охотничьей литературе неоднократно описывался отлов дупелей *Gallinago media* на токах сетями и силками. М.А.Мензбир (1900), например, писал, что с помощью «сети» (судя по описанию, это «шатёр») «... в ночь удаётся добыть пар десять, иногда больше». И дальше: «… случается, что один охотник налавливает в одну весну пар до 600 дупелей и более». Как охота этот способ лова губителен и недопустим, но его можно с большим успехом использовать для кольцевания дупелей. Поэтому мы считаем полезным опубликовать результаты отлова дупелей в районе Окского заповедника весной 1956 года.

Дупеля начинают токовать в нашей местности в первой декаде мая и кончают в конце июня. Мы ловили дупелей с 11 мая по 19 июня. Токование происходит на открытых участках поймы. В период разлива дупеля токуют на незаливаемых гривах, а после спада воды переходят ближе к болотам. В районе Окского заповедника дупелиные тока располагаются как на ровных сенокосных лугах, так и в заболоченных кочкарниках.

Искать тока лучше всего ночью, но можно и на заходе солнца. Ток легко обнаруживается по своеобразному токовому крику дупелей, слышному в тихую погоду на расстоянии до 200 м.

Дупеля начинают собираться на ток примерно за час до захода солнца. Сначала они садятся не на само́м току, а по его окраинам. Перед самым заходом солнца они перемещаются (большей частью пешком) на самый ток и некоторое время сидят совершенно неподвижно.

* Карпович В.Н., Сапетин Я.В. 1958. Отлов дупелей на токах // *Тр. Окского заповедника* **2**: 218-220.

Ток начинается сразу же с наступлением сумерек и продолжается всю ночь. Во время тока дупеля теряют всякую осторожность. Мы выползали на середину тока и лежали там открыто – дупеля подлетали к нам на расстояние вытянутой руки.

Сначала мы пробовали ловить дупелей шатром на току, на котором собиралось до 12 птиц. Шатёр диаметром 8 м из капроновой дели с ячеей 45 мм мы устанавливали на шесте высотой около 3 м. Нижняя часть шатра была поднята над землёй на 50-60 см; шнур от насторожки протягивали к шалашу, стоящему в 20 м от шатра. Одновременно под шатёр заходило не более 4 дупелей. Нам удалось накрыть 3 птиц. Дупеля сначала затаились, а затем выползли из-под шатра, сеть которого была слишком туго растянута оттяжками. В связи с этим в дальнейшем мы отказались от применения шатра и стали пользоваться одностенными сетями.

Сети из капроновой или хлопчатобумажной нити не толще 0.6 мм с ячеей 30-50 мм размером от 1.5×2.0 до 15×15 м свободно укладывались на траве по всей площади тока, так что общая площадь, занятая сетями, составляла до 360 м^2. Иногда несколько небольших сетей вешалось вертикально на палках высотой до 1 м; нижний край сети при этом лежал свободно на земле. При таком положении в сеть попадались дупеля, перелетавшие по току. К середине сети, лежащей на земле в центре тока, мы в ряде случаев привязывали верёвку, идущую к шалашу. Заметив дупеля, зашедшего под сеть, мы вспугивали его, дёрнув за верёвку, и он при этом всегда запутывался в сети. С помощью этого приёма отлов удаётся ускорить. Сети должны быть окрашены в тёмный цвет. Белые сети дупеля обходят или облетают.

Запутавшихся дупелей долго оставлять в сетях не следует – они сильно путаются и повреждают себе кожу под крыльями. Когда ловец выходит из шалаша, дупеля либо затаиваются на току, либо отлетают, но через несколько минут возвращаются обратно и продолжают токовать. Однако на небольших токах особенно спешить с выемкой птиц не надо, так как почти всегда на бьющегося в сети дупеля нападает другой и запутывается рядом с ним. Окольцованный дупель не уходит с тока и нередко опять попадается в сеть в ту же ночь.

Весной 1956 года мы обловили три дупелиных тока. На одном току насчитывалось 12, на другом – 6-7, на третьем – около 20 дупелей.

На первом току мы за три ночи выловили всех 12 дупелей, причём четыре из них попадались дважды, а один – трижды. На втором току было поймано за одну ночь четыре птицы. На третьем току за четыре ночи было поймано 19 дупелей, причём пять из них попадались в сети по два раза. На этом же току, кроме того, были пойманы поручейник *Tringa stagnatilis* и чибис *Vanellus vanellus*. Всего за 8 ночей было поймано 37 куликов. Максимально за одну ночь нам удалось поймать

9 дупелей. На больших токах результаты лова должны быть значительно лучше.

Литература

Мензбир М.А. 1900. *Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа.* М., **1**: 1-478.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск **892**: 1730-1731*

О пуховых нарядах птенцов большого подорлика *Aquila clanga* по наблюдениям в Окском заповеднике в 1954-1955 годах

С.Г.Приклонский

*Второе издание. Первая публикация в 1958**

В отечественной орнитологической литературе нет подробной характеристики пуховых нарядов птенцов большого подорлика *Aquila clanga*, а в кратких описаниях Б.К.Штегмана (1937) и Г.П.Дементьева (1951) имеется существенное разногласие. Штегман пишет, что первый наряд птенцов большого подорлика чисто-белый, шелковистый, второй наряд (к концу второй недели и началу третьей) – весьма густой, шерстистый и бледно-сероватый. Дементьев говорит, что первый пуховой наряд этих птиц буровато-серый, а второй – серовато-белый.

В 1954-1955 годах нам пришлось наблюдать за несколькими гнёздами больших подорликов и при этом встретить следующие вариации окраски пуховых нарядов этих птиц.

Гнездо большого подорлика № 1, находившееся в западной части Окского заповедника, было занято, очевидно, одной и той же парой этих птиц оба года. В 1954 году в этом гнезде было 2 птенца, а в 1955 – 1. При этом окраска пуховых нарядов птенцов была одинаковой и ближе подходила к описанию Б.К.Штегмана. Приводим описание этих птенцов.

Первый пуховой наряд мы наблюдали 24 июня 1954, когда младшему птенцу было 2-3 дня, а старшему – около 10 дней. В это время пух, покрывавший птенцов, был чисто-белым с лёгким желтоватым оттенком на плечах и голове. 5 июля старший птенец одел второй пуховой наряд. Пух на его голове и шее был окрашен в беловато-серый

* Приклонский С.Г. 1958. О пуховых нарядах птенцов большого подорлика по наблюдениям в Окском заповеднике в 1954-1955 гг. // *Тр. Окского заповедника* **2**: 177-178.