

Птицы посёлка Кивач и его окрестностей

К.А.Петрова

Кристина Анатольевна Петрова. Институт биологии, экологии и агротехнологий.
Петрозаводский государственный университет. Проспект Ленина, д. 33, Петрозаводск,
Республика Карелия, 185910, Россия. E-mail: petrovak@petrsu.ru; janerpochka@yandex.ru

Поступила в редакцию 12 июля 2017

Орнитофауна заповедника «Кивач» включает в себя 216 видов, из которых 134 гнездятся в заповеднике и его окрестностях. Для данной территории характерно преобладание таёжных птиц, в меньшей степени представлены южные виды, предпочитающие лиственные леса и открытые ландшафты (Яковлева 2006). В 2000 году «Кивач» получил статус ключевой орнитологической территории международного значения. В пределах заповедника располагается одноименный населённый пункт, занимающий территорию около 20 га и вытянутый вдоль реки Суны на 2 км (рис. 1-3).




Рис. 1. Посёлок Кивач. 2017 год. Фото К.А.Петровой.

Расположение посёлка Кивач среди малонарушенных старовозрастных среднетаёжных лесов заповедника во многом определяет специфику его локальной орнитофауны. В то же время наличие небольшой площади мозаичного агроландшафта, старого плодово-ягодного питомника, дендрария и заброшенных сенокосных лугов в окрестностях деревни способствуют увеличению видового разнообразия птиц. Подобные биотопы встречаются, помимо посёлка и центральной усадьбы заповедника, только на окраинах заповедника в его охранный зоне.



Рис. 2. Посёлок Кивач. 2017 год. Фото К.А.Петровой.



Рис. 3. Тихий участок реки Суны у посёлка Кивач – излюбленное место отдыха, кормёжки и размножения целого ряда водяных птиц, 2017год. Фото К.А.Петровой.

Несколько видов птиц, типичных для населённых пунктов, в последние десятилетия прекратили гнездиться в заповеднике и больше не встречаются в посёлке. К ним относятся скворец *Sturnus vulgaris*, полевой *Passer montanus* и домовый *P. domesticus* воробьи, обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella*, а также сизый голубь *Columba livia*, отдельные особи которого изредка залетают на территорию «Кивача» из соседних деревень (Яковлева 2006). Причиной сокращения численности синантропных видов птиц как в Киваче, так и в других населённых пунктах Карелии является ухудшение кормовой базы, вызван-

ное экономическим кризисом в республике. За последние десятилетия в Карелии отмечается увеличение площади залуженных пашен, сильное сокращение выпаса скота, ликвидация пригородного огородничества, звероводческих ферм, уменьшение площадей под однолетними злаками и овощными культурами (Государственный доклад... 2013). При этом значительное сокращение кормов антропогенного происхождения в сельской местности привело к росту городских популяций у таких видов, как серая ворона *Corvus cornix* и большая синица *Parus major* (Сазонов 2004). В настоящее время из синантропных врановых в посёлке Кивач круглогодично встречаются серая ворона и сорока *Pica pica*, оба вида немногочисленны, но регулярно гнездятся в окрестностях посёлка. Ещё два синантропных вида, встречающиеся в посёлке — это деревенская *Hirundo rustica* и городская *Delichon urbica* ласточки. Скворцы до 1980-х годов обитали в посёлке Кивач и размножались в скворечниках, которые до сих пор сохранились кое-где во дворах и на усадьбе заповедника. Последняя пара скворцов гнездилась в Киваче в 1985 году, а в настоящее время этот вид лишь изредка встречается в период весенней миграции (Яковлева 2006). Снижение численности и даже полное исчезновение скворцов из прежних мест обитания в Карелии связано с агрессивными мероприятиями по борьбе с этими птицами, проводимыми в Европе в 1980-х годах (Зимин, Ивантер 2002).



Рис. 4. Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* на реке Суна у посёлка Кивач. 2016 год. Фото А.Н.Шербакова.

Дважды в год над посёлком можно наблюдать пролётные стаи серых журавлей *Grus grus*, разных видов гусей, а также лебедей-кликун *Cygnus cygnus*. Случается, что несколько лебедей останавливаются в заливе реки Суны у тихого берега вдали от жилых домов (рис. 3, 4).

Большие крохали *Mergus merganser* и гоголи *Bucephala clangula* встречаются с конца марта в полыньях и на незамерзающих участках Суны. Позже гоголи покидают окрестности деревни, а крохали могут устроить гнездо и на чердаках бань на берегу и в окрестностях посёлка и встречаются до осени (рис. 5). С июня по сентябрь в вечерние и утренние часы молодые и взрослые крохали любят отдыхать на полузатонувших брёвнах и деревянных мостках. На лесистом речном острове могут гнездиться кряква *Anas platyrhynchos* и свиязь *Anas penelope*. На берегах с мая по июль можно увидеть и услышать перевозчика *Actitis hypoleucos*. Вечерами над посёлком нередко тянет вальдшнеп *Scolopax rusticola*, гнёзда которого можно обнаружить в лесу недалеко от домов.




Рис. 5. Самка большого крохала *Mergus merganser* с выводком на реке Суне в у посёлка Кивач. 2016 год. Фото А.Н.Щербакова.

Есть в Киваче и небольшая колония сизых чаек *Larus canus*: около десятка особей ежегодно строят гнёзда на берегу залива реки и на острове посреди неё. В последние годы сизые чайки стали устраивать гнёзда на некотором отдалении от воды: в огороде среди грядок, откуда до реки около 50 м, и даже на крышах домов и гаражей в 150-200 м от воды. При этом чайки проявляют пониженную тревожность к людям, которые проходят в нескольких метрах от гнезда. Работая в огороде буквально в нескольких метрах от гнезда, люди не вынуждают самку прерывать насиживание. Интересно, что вылупившиеся птенцы могут несколько дней не спускаться к воде и держатся среди грядок (рис. 6). Вероятно, гнездиться относительно далеко от воды сизые чайки стали после случая, когда много гнёзд затопило из-за повышения уровня реки после сброса воды из Гирвасского водохранилища. Кроме сизых чаек, на Суне возле посёлка время от времени появляются малые *Larus minutus* и озёрные *L. ridibundus* чайки, гнездящиеся в другой части заповедника, на озере Сундозере (Яковлева 2006). Иногда залетает клуша *Larus fuscus*, занесённая в Красную книгу Карелии.



Рис. 6. Пять птенцов сизой чайки *Larus canus* из трёх выводков проводят большую часть времени не на воде, а в огородах. 2017 год. Фото К.А.Петровой.

В апреле в деревне появляются стайки зябликов *Fringilla coelebs* и чёрных дроздов *Turdus merula*, относительно недавно заселивших Карелию (Хохлова 2008, 2013). Они держатся на проталинах во дворах, ищут пищу под плодовыми деревьями. С мая по июнь и днём и короткой белой ночью в Киваче не смолкают песни птиц, гнездящихся в посёлке и окрестностях: это зяблик, садовая славка *Sylvia borin*, большая синица, зеленушка *Chloris chloris*, мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca*, пеночки весничка *Phylloscopus trochilus* и трещотка *Ph. sibilatrix*, белая трясогузка *Motacilla alba*, горихвостка-лысушка *Phoenicurus phoenicurus*. В огородах и садах можно услышать пение чечевицы *Carpodacus erythrinus*. Ночью в густых зарослях кустарников поёт садовая камышевка *Acrocephalus dumetorum*. На краю посёлка кукуют самцы кукушки *Cuculus canorus*, иногда слышатся хохочущие крики самки. На зарастающей пожне, вытянутой вдоль деревни за полосой леса, в последние годы можно встретить вяхиря *Columba palumbus*, глубокий спад численности которого отмечался в 2007-2012 годах (Яковлева 2015). На разнотравных лугах, на отдалённых огородах и даже в сильно заросших дворах можно услышать крик коростеля *Crex crex*.

После выведения птенцов из лесных биотопов птицы перемещаются к открытым пространствам. В посёлке в середине лета становится больше кочующих стаяк воробьиных птиц. На травянистых растениях и берёзах кормятся чижи *Spinus spinus*. Среди ветвей черёмухи можно увидеть питающихся ягодами обыкновенных дубоносов *Coccothraustes coccothraustes*, обогативших гнездовую орнитофауну Карелии несколько десятилетий назад (Хохлова и др., 2008). Дрозды съедают несобранный

урожай черноплодной рябины и ирги. С августа на окраинах посёлка можно наблюдать стайки кочующих ополовников *Aegithalos caudatus*. Позднее появляются стайки чечёток *Acanthis flammea*, кормящихся в кронах ольхи и берёзы. К середине октября в Киваче практически завершается миграция воробьиных птиц, хотя отдельные зяблики, дрозды, зарянки *Erithacus rubecula* и крапивники *Troglodytes troglodytes* регулярно встречаются в посёлке до конца октября. В это же время тянутся пролётные стаи гусей, лебедей и журавлей.



Рис. 7. Пара снегирей *Pyrrhula pyrrhula* (самец и самка) едят почки черёмухи *Padus avium*. 2017 год. Фото А.Н.Щербакова.

Зимой в посёлке Кивач остаётся несколько видов воробьиных, регулярно встречающихся в Карелии на зимовке: большая синица, лазоревка *Parus caeruleus*, московка *Parus ater*, пухляк *Parus montanus*, желтоголовый королёк *Regulus regulus*, пищуха *Certhia familiaris*, снегирь *Pyrrhula pyrrhula* и свиристель *Bombycilla garrulus*. На незамерзающих участках Суны держатся оляпки *Cinclus cinclus*. В годы урожая семян хвойных в посёлке можно видеть стаи клестов – еловиков *Loxia curvirostra*, реже сосновиков *L. pytyopsittacus* и белокрылых *L. leucoptera*. У жилых строений можно встретить сойку *Garrulus glandarius* и поползня *Sitta europaea*, была также замечена и редко остающаяся на зимовку в Карелии лесная завирушка *Prunella modularis*. Ранней весной на кормушках охотно кормятся снегيري, зеленушки, юрки *Fringilla montifringilla*. Круглогодично в посёлке Кивач и его окрестностях можно увидеть большого пёстрого дятла *Dendrocopos major*. Залетают также желна *Dryocopus martius*, малый пёстрый *Dendrocopos minor* и белоспинный *Dendrocopos leucotos* дятлы.

В заключение хочется отметить чуткое и любознательное отношение местного населения, в основном состоящего из сотрудников заповедника и членов их семей, к птицам, обитающим по соседству. В посёлке Кивач не было случаев разорения людьми гнёзд дуплогнездников в

синичниках, развешанных в деревенском лесу, что, к сожалению, нередко случается около многих других населённых пунктов. Птенцов сизых чаек, преодолевающих путь от крыши гаража до реки, оберегают не только их родители и другие члены колонии, но и люди, издали наблюдая за птенцами и зорко следя за домашними кошками.

Л и т е р а т у р а

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2012 году. 2013 / Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия; Ред. коллегия: А.Н.Громцев (гл. ред.), Ш.Ш.Байбусинов, О.Л.Кузнецов, Т.Б.Ильмаст. Петрозаводск: 1-328.
- Зимин В.Б., Ивантер Э.В. 2002. *Птицы*. 3-е изд., испр. и доп. Петрозаводск: 1-288.
- Сазонов С. В. 2004. *Орнитофауна тайги Восточной Фенноскандии: исторические и зонально-ландшафтные факторы формирования*. М.: 1-391.
- Хохлова Т.Ю. 2008. О формировании периферийной популяции чёрного дрозда *Turdus merula* в южной Карелии // *Рус. орнитол. журн.* **17** (429): 1080-1081.
- Хохлова Т.Ю. 2013. Чёрный дрозд *Turdus m. merula* в Карелии на северо-восточном пределе распространения // *Рус. орнитол. журн.* **22** (953): 3499-3500.
- Хохлова Т.Ю., Сазонов С.В., Сухов А.В. 2008. Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes* в Карелии // *Рус. орнитол. журн.* **17** (408): 458-467.
- Яковлева М.В. 2006. Изменения населения гнездящихся видов птиц заповедника «Кивач» за последние 40 лет // *Тр. заповедника «Кивач»* **3**: 3-18.
- Яковлева М.В. 2015. Мониторинг гнездовой численности лесных видов птиц в заповеднике «Кивач» // *Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья»* **4**: 5-12.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1472: 2949-2953

Находка гнезда туркестанского белого аиста *Ciconia ciconia asiatica* в южной части Ферганской долины

И.Р.Романовская

Ирина Рашитовна Романовская. Бульвар Эркиндик, 20, школа-гимназия № 6,
г. Бишкек, Кыргызстан

Поступила в редакцию 2 июля 2017

Туркестанский белый аист *Ciconia ciconia asiatica* Severtzov, 1873 – редкий гнездящийся вид Киргизии, занесённый в Красную книгу Кыргызстана. Информация о его распространении в республике недостаточная, поэтому считаю целесообразным сообщить о новом пункте его гнездования, найденном в южной части Ферганской долины.

Гнездо обнаружено в 1 км восточнее села Айдаркен Кадамжайского района Баткенской области на бетонной опоре высоковольтной линии