

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных
Уральское орнитологическое общество

**МАТЕРИАЛЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ
П Т И Ц
НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

Сборник статей

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2004

УДК 598.2:591
М 341

Ответственный редактор:
доктор биологических наук
В. К. Рябицев

М 341 **Материалы** к распространению птиц на Урале, в
Приуралье и Западной Сибири: Сб. статей и кратких
сообщ. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. — с.

ISBN 5-7525-1300-6

Девятый выпуск сообщений с новыми данными о местах гнездования, зимовки, путях миграций и залетах птиц, статьями с полным обзором орнитофауны отдельных территорий.

Сборник предназначен для орнитологов, биогеографов, преподавателей биологических факультетов, любителей птиц.

ISBN 5-7525-1300-6

© Коллектив авторов, 2004
© Оформление. В. К. Рябицев,
Издательство УрГУ, 2004
© Издательство Уральского
университета, 2004

Скопа *Pandion haliaetus*. Две парящие птицы, возможно, пролетные, отмечены над р. Чебиткер 28 сентября.

Зимняк *Buteo lagopus*. За 30 минут наблюдений 29 сентября над р. Васюган в юго-западном направлении пролетело 7 птиц.

Чеглок *Falco subbuteo*. Охотящуюся птицу наблюдали 28 сентября над пойменными лугами в устье р. Чебиткер (приток Васюгана).

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. Местные жители производят зимний отлов куропаток ловчими сетями. Таким способом добывается от 1 до 6 птиц в день на одного охотника.

Краснозобый конек *Anthus cervinus*. Одиночная птица перелетала по лугам вдоль р. Чебиткер 28 сентября.

Урагус *Uragus sibiricus*. На окраине пос. Наунак наблюдали кочующую стайку из 8 птиц 27 сентября.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. Три птицы отмечены сидящими на кустах в пос. Наунак 27 сентября.

Подорожник *Calcarius lapponicus*. В пос. Наунак 27 марта встречена одиночная птица. Крупные (до 200) и средние (по 30–50 особей) стаи отмечались 26 марта вдоль трассы Томск-Колпашево.

Следует отметить, что крупные стаи **подорожников** и **пуночек** *Plectrophenax nivalis* наблюдались вдоль автомагистрали только в южнотаежной подзоне (до широты г. Колпашево). Видимо в это время названные виды еще не подкочевывают в среднетаежную подзону. Зарегистрирована дата прилета **грача** *Corvus frugilegus* на широту Каргасока–Васюгана — 26 марта (стая из 30 птиц).

ЛИТЕРАТУРА

Блинова Т. К., Мухачева М. М., Мударисова Г. Р. Орнитологический очерк Нижнего Привасюганья (Томская область) // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2003. С. 37–48.

ПТИЦЫ СРЕДНЕТАЕЖНОГО ПРИВАСЮГАНЬЯ

Т. К. Блинова, И. В. Громышев, М. М. Самсонова, И. А. Лютаев, А. М. Хабибулина, И. Н. Мариничева

Кафедра экологии Томского гос. университета, пр. Кирова, 14, оф. 36,
г. Томск, 634034. E-mail: btk@green.tsu.ru

Исследования проведены с 30 апреля по 12 июля 2004 г. в окрестностях п. Средний Васюган (280 км от устья р. Васюган; Каргасокский р-н, Томской области). Район работ лежит в подзоне средней тайги; географические координаты: 59° с. ш. 78° в. д.

Проводились утренние четырехчасовые учеты мигрирующих птиц с постоянного наблюдательного пункта (далее НП) на берегу р. Васюган в течение двух недель (4–17 мая), экскурсии и учеты на маршрутах. Последние осуществлялись с 16 мая по 12 июля в 11 ландшафтных урочищах (25-километровый отрезок русла р. Васюган, ее пойма, приречный поселок, междуречные и пойменные озера, сосновые боры, заболоченные березово-сосновые и смешанные темнохвойно-лиственные леса, сосново-сфагновые верховые и березовые переходные болота). Названные урочища за период работ посещались от 4 до 16 раз. Один раз в месяц проводились точечные ночные учеты: с неподвижного НП прослушивалась вокализация птиц с ночным типом активности. Такие учеты проведены на верховом сосново-сфагновом болоте (14 мая) и в экотонах: на берегу Васюгана, на опушке соснового леса (23 июня) и на границе закустаренной поймы и темнохвойной тайги (5 июля). Обнаружено 147 видов птиц (около 75 % от теоретически возможных на этой территории с любым статусом пребывания). Из них 96 видов определенно гнездятся, 25 гнездятся предположительно, еще 23 вида относятся к пролетным или имеют статус неясного пребывания. Гнездящимися считали виды, у которых найдены гнезда или слетки, а также многочисленные и широко распространенные, гнездование которых не вызывает сомнения.

Весну 2004 г. можно охарактеризовать как позднюю: снежный покров сохранялся всю первую декаду мая, Васюган вскрылся только 14 мая, что почти на 10 дней позже среднесезонных сроков.

* * *

Краснозобая гагара *Gavia stellata*. Одиночная особь держалась на небольшом пойменном озере среди привасюганских лугов 14 мая.

Чернозобая гагара *G. arctica*. Редкая, предположительно гнездящаяся птица. Отмечены одиночные особи с НП 13 и 16 мая — они пролетели низко над рекой. Одна встреча зарегистрирована на междуречных открытых озерах в третьей декаде мая. Восемь птиц держалось на крупном междуречном озере 10 июля.

Красношейная поганка *Podiceps auritus*. На озерах среди пойменных лугов 14 мая наблюдали стаю около 300 особей; две птицы из этой стаи добыты местными охотниками и осмотрены нами.

Серый гусь *Anser anser*. Стая из 48 птиц пролетела клином утром 17 мая в северо-западном направлении.

Гуменник *A. fabalis*. Одиночная птица кружила 12 мая над Васюганом и пойменными лугами, присаживаясь на сухие гривки.

Лебедь-кликун *Cygnus cygnus*. Редкая, возможно, гнездящаяся

птица. По словам местных жителей, лебеди прилетели в середине апреля. За период наблюдений с НП отметили три пролетные группы: 8 мая 4 птицы пролетели на северо-восток, 12 мая — 2 на восток и 17 мая — 11 особей цепочкой на север. Одиночную птицу видели 30 июня на небольшом озере в пойме.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Немногочисленная, видимо, гнездящаяся птица. Первая встреча — 2 мая. Пролет этой утки в пойме Васюгана практически не выражен: отмечались одиночки, пары и группы до 4 птиц; летели кряквы преимущественно вдоль русла Васюгана. В репродуктивный период в районе работ весьма немногочисленна, встречалась на озерах среди приречных мелколиственных лесов, на верховых сосново-сфагновых болотах, на пойменных привасюганских лугах (где наиболее обычна), а также на междуречных открытых озерах.

Шилохвость *A. acuta*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся утка. Первое появление шилохвosti зафиксировано 5 мая, когда реки и озера были подо льдом. Весенний пролет в пойме Васюгана выражен более отчетливо, чем у предыдущего вида, но его также нельзя назвать интенсивным: за две недели наблюдений отмечено 7 транзитных стай с числом птиц от 3 до 56. Направление пролета преимущественно северное и северо-западное, т.е. не вдоль русла. Высокое обилие шилохвosti зафиксировано на пойменных лугах во второй половине мая; встречалась она также в это время на ленточных пойменных озерах. Позднее не отмечалась.

Связь *A. penelope*. Обычная, по всей видимости, гнездящаяся утка. Весенний пролет не выражен (отмечено с НП всего две пары и одиночная особь). Была многочисленна только на междуречных открытых озерах во второй половине мая. Обычна на ленточных пойменных озерах, озерах и временных лужах среди приречных мелколиственных лесов, а также на обводненных мезотрофных березовых болотах.

Широконоска *A. clypeata*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся утка. Первое появление птиц зарегистрировано 13 мая. Явно транзитная группа из 4 птиц единственный раз отмечена с НП, т.е. можно говорить о полном отсутствии видимого утреннего пролета на данном отрезке Васюгана. Эта утка обычна только во второй половине мая на междуречных открытых озерах и на привасюганских пойменных лугах.

Чирок-свистунок *A. crecca*. Одна из самых немногочисленных речных уток, гнездование возможно. Характерно полное отсутствие видимого пролета. Отмечалась среди заболоченных березово-сосновых лесов, на пойменных лугах, пойменных и междуречных озерах, всюду в небольшом числе.

Чирок-трескунок *A. querquedula*. Обычная гнездящаяся утка. Появление первых птиц отмечено 4 мая. Как и у большинства других уток, утренний видимый пролет практически не выражен (отмечено всего 9 транзитных птиц). Во второй половине мая эта утка многочисленна на пойменных лугах и междуречных озерах, к июню обилие повсеместно снижается. Самку с большим выводком, включающим 15 утят размером с 1/5 ad, встретили на междуречном озере Лисье 3 июля; на ленточном пойменном озере 4 июля видели 3 выводка с числом утят 2, 10, 12, на междуречном открытом озере 10 июля — два выводка — 5 и 7 утят.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. Очень редкая в районе исследований утка с неясным характером пребывания. Два самца осмотрены 14 мая в добыче местных охотников, одиночную самку видели на междуречном открытом озере 17 мая.

Хохлатая чернеть *A. fuligula*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся утка. Прилетела несколько позже речных уток — 13 мая. За период наблюдений с НП отмечено 34 транзитных птицы, при этом только одна стая насчитывала 20 особей, остальные птицы летели маленькими группами. Выражена слабая ориентация вдоль русла Васюгана. Концентрация пролетных птиц отмечалась в третьей декаде мая только на открытых междуречных озерах; иногда эта утка встречалась также на озерах и разливах среди пойменных лугов.

Гоголь *Bucephala clangula*. Обычная гнездящаяся птица. Как и у других уток, видимая весенняя миграция практически не выражена: за весь период наблюдений к явным мигрантам отнесено всего 10 особей в маленьких группах, все они четко придерживались русла реки. В летний период эта нырковая утка обычна только на озерах обоих типов и на привасюганских лугах.

Турпан *Melanitta fusca*. Стая из 19 птиц пролетала вдоль русла Васюгана в восточном направлении 14 мая и 15 мая 45 птиц пролетели на север.

Луток *Mergus albellus*. Самец и две самки пролетели вдоль русла Васюгана на северо-запад 14 мая.

Большой крохаль *M. merganser*. Семь птиц — пять самцов и две самки — держались 30 мая на небольшом междуречном озере.

Скопа *Pandion haliaetus*. Редкая, без сомнения, гнездящаяся птица. Отмечены две одиночные особи: одна из них сидела на вершине дерева среди сосново-сфагнового болота 11 мая, другая охотилась над Васюганом 14 мая (расстояние между местами встреч около 10 км). Летящую над Васюганом птицу видели также 9 июля.

Осоед *Pernis apivorus*. Одиночная особь отмечена 2 мая в полете над заболоченным березово-сосновым лесом.

Черный коршун *Milvus migrans*. Обычный гнездящийся хищник. Появился в Привасюганье весной до начала наших работ, возможно, в середине апреля. Обычен на р. Васюган, в поселке, на лугах; охотится он также над открытыми междуречными озерами и мезотрофными березовыми болотами.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Немногочисленный, по всей видимости, гнездящийся хищник. Первая встреча датируется 2 мая. Хорошо выраженным пролет этого луня был 4 мая: за четыре часа наблюдений пролетело на северо-запад 12 одиночных птиц. Позднее изредка встречался только на привасюганских лугах.

Перепелятник *Accipiter nisus*. Отмечался только дважды — в основных рямах и заболоченных сосново-березовых лесах. Гнездование возможно.

Канюк *Buteo buteo*. Очень редок. Одиночная птица отмечена с НП 14 мая: она перемещалась в северном направлении.

Зимняк *B. lagopus*. Наблюдали хорошо выраженный пролет этого тундрового хищника 4 и 5 мая (возможно, зимняки летели и раньше, до начала наших наблюдений с НП). На север и северо-восток 4 мая пролетело 13 одиночных птиц за четыре часа утренних наблюдений; 5 мая отмечено 29 птиц, причем 8 и 5 из них перемещались группами, кружась спиральной каруселью, в северном направлении. На экскурсии 4 мая с 16 до 18 часов попутно зафиксировано около десятка мигрирующих зимняков.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Жилое гнездо найдено 13 мая на границе закустаренной поймы и гривы (в 8 км от пос. Средний Васюган); оно располагалось на сосне, в 16 м от земли. Гнездо явно надстроенное, многолетнее (известно местным охотникам ряд лет). Пара находилась около гнезда. При повторном осмотре 2 июля обнаружен один крупный птенец в гнезде; одна взрослая особь с беспокойными криками кружила рядом. Одиночную птицу, возможно, территориальную, несколько раз наблюдали в полете или на берегу открытого междуречного оз. Карасье.

Чеглок *Falco subbuteo*. Одиночная птица пролетела 4 мая в северном направлении; позднее нигде не встречали.

Дербник *F. columbarius*. Единственная встреча 13 мая на сосново-сфагновом болоте.

Кобчик *F. vespertinus*. Охотящуюся птицу наблюдали над закустаренной поймой 17 мая.

Пустельга *F. tinnunculus*. Встречена один раз в полете над сосново-сфагновым верховым болотом 13 мая.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Обычный гнездящийся вид, населяющий

ленточные сосновые боры-брусничники на террасах и смешанные лиственно-темнохвойные леса. Молодые птицы отмечены 4 июля в смешанном лиственно-темнохвойном лесу.

Тетерев *Lyrurus tetrix*. Обычный гнездящийся вид. В первых числах мая с березовых мезотрофных болот доносилось активное токование; в этом месте встречено 7 самцов, разлетающихся с тока.

Глухарь *Tetrao urogallus*. Обычен, гнездится. В заболоченном сосняке по кромке березового болота 2 мая видели трех самок и самца. Глухарей мы также часто встречали на гравийной трассе, проложенной от поселка к Северо-Васюганскому газовому месторождению: утром птицы вылетали сюда заглатывать гастролиты.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. Гнездящаяся птица со спорадичным распространением. Около десятка птиц в весеннем наряде видели в низкорослых сосновых рядах 2 мая с машины на 5-километровом отрезке проселочной дороги.

Серый журавль *Grus grus*. Пара птиц пролетела в северном направлении вечером 3 мая.

Коростель *Crex crex*. Сильно закустаренная пойма Среднего Васюгана неблагоприятна для обитания этого вида, он здесь не очень многочислен. Гнездится.

Погоныш *Porzana porzana*. Обычная, по всей видимости, гнездящаяся птица. Ночную вокализацию самцов слышали на заболоченных окраинах поселка, а также во время ночного учета (с точечного пункта) в луговой пойме Васюгана.

Малый зуек *Charadrius dubius*. Относительно редкий гнездящийся кулик. Первое появление зуйка отмечено 10 мая. На берегу искусственного пруда с песчаными берегами наблюдали 2 пары беспокоящихся птиц 23 июня.

Чибис *Vanellus vanellus*. Немногочисленный кулик, гнездование возможно. Группу из 14 птиц впервые видели 2 мая на льду Васюгана. Отмечена только одна относительно крупная стая из 19 особей, пролетевших 5 мая на северо-восток. В остальных случаях это были небольшие группы из 3–4 птиц. Во второй половине мая этот кулик был обычен на пойменных лугах, в других местообитаниях не отмечен.

Кулик-сорока *Haematopus ostralegus*. Зарегистрирована единственная встреча: 12 мая две птицы сидели на снегу возле пойменной речки, в 100 м — еще 3 птицы на том же берегу.

Черныш *Tringa ochropus*. Обычный гнездящийся кулик. Первое появление отмечено 4 мая. Пролет не выражен. В репродуктивный период этот кулик обычен в сосновых рядах, заболоченных березово-

сосновых лесах, на привасюганских пойменных лугах и березовых мезотрофных болотах.

Фифи *T. glareola*. Немногочисленная, предположительно гнездящаяся птица. Появление первых птиц зарегистрировано 12 мая. Видимая утренняя миграция не выражена. В районе работ предпочитает пойменные луга, где обычна; в других местообитаниях — на березовых болотах и приречных мелколиственных лесах — этот кулик редок.

Большой улит *T. nebularia*. Обычен на пролете, редок в гнездовое время, определенно гнездится. В районе работ птицы появились 10 мая. Это один из немногих куликов, видимая миграция которых хорошо выражена. Так, 12 мая пролетело 17 птиц, 13 мая — 43 птицы. В общей сложности за две недели наблюдений с НП отмечено 77 мигрантов. Только в одном случае среди них была стая в 24 особи, еще в трех случаях — группы из 6–10 птиц, остальные — преимущественно одиночки. В репродуктивный период большие улиты встречались на пойменных лугах и сосново-сфагновых верховых болотах; 2 июля наблюдали пару, проявлявшую сильное беспокойство, видимо, у вывода.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Обычная гнездящаяся птица. Первые особи появились 12 мая. Пролет выражен слабо: кулики летели группами от 4 до 6 птиц низко над Васюганом. В репродуктивный период предпочитали ленточные пойменные озера–старицы и р. Васюган; на берегах междуречных открытых озер встречались реже.

Мородунка *Xenus cinereus*. Обычная гнездящаяся птица. Прилет зарегистрирован 16 мая. Видимых миграций в долине Васюгана не наблюдали. Во второй половине мая этот кулик обычен на пойменных лугах и берегах ленточных пойменных озер–стариц. Позднее токующих самцов отмечали по берегам Васюгана и на старицах.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Транзитный вид. Отмечался в районе работ только в период весенних миграций. Пролет начался 13 мая. Во второй декаде этого месяца нередко встречались кормящиеся на привасюганских лугах стаи до 50 особей. Собственно транзитных стай с НП было отмечено две: 38 и 29 птиц перемещались в северном направлении. В третьей декаде мая и позднее этот кулик больше ни разу не отмечался.

Белохвостый песочник *Calidris temminckii*. Одиночная пролетная особь отмечена 28 мая среди разливов на пойменных лугах.

Бекас *Gallinago gallinago*. Обычный гнездящийся кулик. Первый ток зарегистрирован 8 мая. В репродуктивный период относительно эвритопен и обычен на всех типах болот, лугах и в лесах, где имеются пояны и заболоченные луговины.

Лесной дупель *G. megal.* Обычный гнездящийся кулик. Встре-

чался в меньшем спектре местообитаний, чем предыдущий вид: он обычен только в сосновых и мелколиственных приречных лесах.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. Тягу слышали 14 мая в сосновом лесу.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. Транзитный вид. Весенняя миграция в долине Васюгана хорошо выражена. Наблюдался с НП и направленный пролет мигрантов, и крупные стаи отдыхающих птиц. Первая встреча зарегистрирована 3 мая; 6 и 13 мая отмечены крупные стаи на лугах с числом особей соответственно 87 и 120. Летели кроншнепы преимущественно в восточном направлении, придерживаясь береговой линии, а также частично на север. Крупная пролетная стая из 65 особей отмечена лишь один раз, чаще это были небольшие группы из 4–10 птиц, иногда одиночки. Зарегистрировано с НП в общей сложности 95 мигрантов. Пролет проходил в сжатые сроки, в третьей декаде мая птицы отмечались исключительно редко.

Средний кроншнеп *N. phaeopus*. Отмечено только две встречи: 4 мая одиночная птица пролетела с криками над Васюганом в северо-восточном направлении и также одиночная особь отмечена на берегу открытого междуречного озера 14 мая.

Большой веретенник *Limosa limosa*. Редкий кулик, предположительно гнездится. Появление первых птиц зафиксировано 12 мая: стайка из 9 особей сидела на берегу пойменного озера. Видимый пролет выражен слабо: отмечено всего 24 транзитно летящих птицы, направление пролета преимущественно северное. Летели веретенники группами из 4–10 птиц или одиночками. В гнездовое время встречались изредка на пойменных лугах.

Сизая чайка *Larus canus*. Обычная, по всей видимости, гнездящаяся птица. Весенняя миграция хорошо выражена, это один из самых массовых пролетных видов. За период наблюдений отмечено 334 мигранта. При этом 75 % от этого числа птиц пролетело за один день 5 мая. Чайки четко придерживались русла как направляющей линии: 96 % птиц летело на северо-восток — восток. Чайки летели преимущественно крупными стаями от 20 до 50 особей (35 % пролетевших птиц) и группами (от 3 до 20 птиц — 47 %), реже — парами (11 %) и одиночками (7 %). Обилие сизых чаек неуклонно снижалось на озерах от мая к июлю.

Озерная чайка *L. ridibundus*. Эту чайку наблюдали лишь дважды: 3 мая одна особь держалась в стае сизых чаек на льду Васюгана и 16 мая 3 птицы сидели на оз. Лисьем, также вместе с сизыми чайками.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся птица. Первые птицы появились на Среднем Васюгане 13 мая.

Миграция практически не отмечалась. В репродуктивный период довольно редко.

Клинтух *Columba oenas*. Воркование самца слышали в сосновом лесу 3 мая.

Большая горлица *Streptopelia orientalis*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся птица. Появилась в районе работ 14 мая. Придерживается лесов с доминированием в древостое сосны, где обычна.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. Первое появление зарегистрировано 14 мая. Кукушка обычна во всех местообитаниях, за исключением водных.

Глухая кукушка *C. saturatus*. Прилетела в район Среднего Васюга на три дня позже обыкновенной, 17 мая. Обычна во всех облесенных биотопах.

Белая сова *Nyctea scandiaca*. Зимует в районе исследований. На поляне среди соснового леса видели эту сову 3 мая.

Ушастая сова *Asio otus*. Редкая, возможно, гнездящаяся сова. Обнаружена во время ночного учета 14 мая по вокализации в сосновом лесу.

Болотная сова *A. flammeus*. Редкая, очевидно, гнездящаяся птица: территориальную пару постоянно встречали на мезотрофном березовом болоте.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. Одиночную птицу, сидевшую на сосне среди сосново-сфагнового болота, видели 12 мая.

Козодой *Caprimulgus europaeus*. Обычная гнездящаяся птица сосновых и смешанных лиственно-темнохвойных лесов.

Черный стриж *Apus apus*. Редок, возможно, гнездится. Птиц видели в полете над сосновыми лесами.

Вертишейка *Jynx torquilla*. Зарегистрирована единственная встреча 17 мая в приречном мелколиственном лесу.

Желна *Dryocopus martius*. Скорее редкая, чем обычная, без сомнения гнездящаяся птица сосновых и смешанных темнохвойных лесов.

Седой дятел *Picus canus*. Немногочисленный, возможно, гнездящийся дятел. Пару птиц наблюдали 3 мая в заболоченном сосновом лесу.

Пестрый дятел *Dendrocopos major*. Обычная гнездящаяся птица всех типов леса. Найдено гнездо 23 июня в дупле старой осины, в нем кричали птенцы, родители беспокоились рядом.

Белоспинный дятел *D. leucotos*. Обычная гнездящаяся птица, предпочитающая осветленные мелколиственные леса.

Малый дятел *D. minor*. Обычная гнездящаяся птица, приуроченная в основном к мелколиственным лесам. В приречном осиново-березовом лесу 29 июня найдено два гнезда. Оба располагались в дуп-

лах в старых осинах (2 и 4 м от земли), в обоих кричали птенцы, пары беспокоились рядом.

Трехпалый дятел *Picoides tridactylus*. Редкий, возможно, гнездящийся вид. Две встречи зафиксированы за период исследований: в сосновом заболоченном лесу 2 июля и в смешанном лиственно-темнохвойном лесу 6 июля.

Береговая ласточка *Riparia riparia*. Многочисленная гнездящаяся птица береговых обрывов р. Васюган. Очень ранняя встреча первой ласточки зарегистрирована 3 мая. Миграция наблюдалась только 17 мая, за это утро 46 птиц пролетело в северо-западном направлении и 37 — в восточном; птицы четко придерживались русла реки. В репродуктивный период, помимо реки Васюган, где вид многочислен, отмечались охотящиеся особи над приречными поселками, пойменными лугами и озерами. Молодые ласточки появились в приречном поселке 1 июля.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Многочисленная гнездящаяся птица поселков. Прилетели в Привасюганье 12 мая и сразу в масе появились в поселке. Видимый пролет не наблюдался. В летний период нигде кроме поселков не отмечалась.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Поющий над заснеженной поймой Васюгана самец отмечен 2 мая; позднее нигде не встречался.

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. С 10 по 19 мая отмечались стаи и группы птиц от 7 до 100 особей на береговых луговинах и местном аэродроме.

Лесной конек *Anthus trivialis*. Обычная гнездящаяся птица. Населяет в Привасюганье преимущественно верховые сосново-сфагновые болота, реже отмечался в приречных мелколиственных лесах, на окраинах поселка.

Зеленый конек *A. hodgsoni*. Обычная гнездящаяся птица всех типов леса.

Степной конек *A. richardi*. Немногочисленная, видимо, гнездящаяся птица. Отмечена в приречных мелколиственных лесах с полянами, на опушках и в закустаренной пойме.

Желтая трясогузка *Motacilla flava*. Обычная гнездящаяся птица. Первые особи встречены на лугах 12 мая. Населяют в Привасюганье пойменные луга и более нигде не встречены.

Горная трясогузка *M. cinerea*. Немногочисленная, возможно, гнездящаяся птица. Первая встреча зарегистрирована 3 мая. Населяет берега малых речек — притоков Васюгана.

Белая трясогузка *M. alba*. Обычная, местами многочисленная гнездящаяся птица. Пролет этой рано появляющейся (в середине апреля)

трясогузки растянут: 5 мая пролетную стаю из 62 особей наблюдали сидящей на проводах в поселке. Стая из 50 мигрантов отмечена 6 мая с НП: птицы перемещались в северо-восточном направлении. В репродуктивный период населяет преимущественно приречный поселок, где многочисленна, изредка отмечается также и в удаленных от поселка биотопах (в лесах, на болотах). Пара строила гнездо в старой брошенной на берегу барже 4–10 мая. Молодые птицы появились в поселке 3 июля.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*. Редкая, возможно, гнездящаяся птица. Пара встречена на окраине поселка 3 июня.

Серый сорокопут *L. excubitor*. Единственная встреча зарегистрирована 2 мая на березовом мезотрофном болоте.

Иволга *Oriolus oriolus*. Относительно редка, по всей видимости, гнездится. Первую песню слышали 16 мая. Населяет участки леса среди привасюганских лугов и приречные мелколиственные леса.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. Многочисленная гнездящаяся птица поселков. Скворцы еще встречались в поселке 22 июня, но к первым числам июля покинули его и переместились вместе с молодыми на пойменные луга.

Кукша *Perisoreus infaustus*. Немногочисленная, без сомнения, гнездящаяся птица. Встречается в Привасюганье в смешанных лиственно-темнохвойных и в заболоченных березово-сосновых лесах.

Сойка *Garrulus glandarius*. Единственная встреча одиночной птицы зарегистрирована в заболоченном березово-сосновом лесу 3 июня.

Сорока *Pica pica*. Обычная, в поселке многочисленная гнездящаяся птица. Начало откладки яиц пришлось на последнюю пятидневку апреля — начало мая. В это время осмотрено 4 гнезда, в которых находилось от двух до восьми яиц. Вылупление птенцов в одном из гнезд отмечено 3 июня.

Галка *Corvus monedula*. В Привасюганье относительно редка, возможно, гнездится. Изредка встречалась только в первой половине мая.

Грач *C. frugilegus*. В первой половине мая одиночки и небольшие группы птиц встречались в поселке, позднее не отмечены.

Серая ворона *C. cornix*. Обычная гнездящаяся птица. Придерживается в основном поселка и его ближайших окрестностей, но встречалась и в других биотопах, в том числе — в лесах с участием темнохвойных пород. Готовое, еще пустое гнездо осмотрено 1 мая; 28 мая в нем находилось 4 яйца; 22 июня в гнезде сидели два крупных птенца, один из которых слетел при осмотре.

Гибридная ворона *C. corone* x *C. cornix*. Со 2 по 5 мая в поселке встречены 5 гибридных ворон из группы «темных гибридов» (Блинов,

1998): общий тон окраски у них черный, брюхо и грудь в серых пестринах разной степени интенсивности. Позднее птицы исчезли и более не встречались.

Ворон *C. corax*. Эвритопная, обычная гнездящаяся птица, зарегистрированная в ряде местообитаний, в том числе — в поселке. Концентрацию этих птиц наблюдали на поселковой свалке: здесь можно было встретить до трех десятков особей. Здесь же отмечена пара с крупным молодым 1 июля.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. Многочисленная на весенних кочевках и редкая в гнездовое время птица. В первой декаде мая по поселку кочевали стаи до сотни птиц, позднее здесь не отмечались. В репродуктивный период свиристелей изредка наблюдали только на верховых сосново-сфагновых болотах.

Певчий сверчок *Locustella certhiola*. Обычный, на лугах многочисленный гнездящийся вид.

Пятнистый сверчок *L. lanceolata*. Относительно редок, возможно, гнездится. Наблюдался только на мезотрофных березовых болотах.

Садовая камышовка *Acrocephalus dumetorum*. Обычная гнездящаяся птица. Первые поющие самцы отмечены 23 мая. Гнезда с кладками находили с 5 по 26 июня.

Садовая славка *Sylvia borin*. Обычная гнездящаяся птица. Найдено недостроенное гнездо 5 июня в кустарниковых зарослях под пологом приречного мелколистного леса, пара беспокоилась рядом.

Серая славка *S. communis*. Обычная гнездящаяся птица. Появилась в Привасюганье 15 мая.

Славка-завирушка *S. curruca*. Обычная гнездящаяся птица. Первые поющие самцы появились 16 мая. Встречалась эта славка в поселках, заболоченных березово-сосновых лесах и сосновых борах, в приречных мелколесьях.

Весничка *Phylloscopus trochilus*. Обычная гнездящаяся птица. Первую песню услышали 3 мая. Населяет облесенные болота и заболоченные леса.

Теньковка *Ph. collybita*. Обычная гнездящаяся птица. Первая песня отмечена 3 мая, хотя, возможно, она появилась раньше. Населяет все лесные местообитания, встречается и в поселках.

Таловка *Ph. borealis*. Обычная гнездящаяся птица. Первые поющие самцы отмечены 15 мая. Приурочена к лесам с доминированием сосны.

Зеленая пеночка *Ph. trochiloides*. Немногочисленная гнездящаяся птица. Появилась в Привасюганье 16 мая. Не выявлено предпочтения какому-либо типу леса.

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca*. Скорее редкая, чем обычная, возможно, гнездящаяся птица. Отмечалась только в сосновых борах и приречных мелколиственных лесах.

Малая мухоловка *F. parva*. Редкая гнездящаяся птица. Встречена в первой декаде июня в заболоченных березово-сосновых лесах и в начале июля — в смешанных лиственно-темнохвойных лесах. Здесь добыт слеток.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. Пару мухоловок наблюдали в мелколиственном приречном лесу 18 мая.

Черноголовый чекан *Saxicola torquata*. Немногочисленная, по всей видимости, гнездящаяся птица. Приурочена в основном к луговинам и окраинам поселка.

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Обычная гнездящаяся птица поселков. Первую птицу встретили 5 мая, возможно, она прилетела раньше.

Горихвостка-лысушка *Phoenicurus phoenicurus*. Обычная гнездящаяся птица. Первые поющие самцы отмечены 4 мая, не исключено и более раннее ее появление. Эвритопный вид, встреченный во всех в той или иной мере облесенных местообитаниях и в поселках.

Зарянка *Erithacus rubecula*. Редкая, возможно, гнездящаяся птица. Первую песню слышали 3 мая. Тяготеет к сосновым борам и смешанным лиственно-темнохвойным лесам.

Синехвостка *Tarsiger cyanurus*. Обычная, без сомнения, гнездящаяся птица лесов с преобладанием в древостое сосны. Первые поющие самцы отмечены 8 мая.

Соловей-красношейка *Luscinia calliope*. Единственную песню слышали в участке леса среди пойменных лугов 30 июня.

Варакушка *L. svecica*. Редкая, возможно, гнездящаяся птица. Встречена только в поселке в первой половине мая.

Чернозобый дрозд *Turdus atrogularis*. Редкий гнездящийся дрозд. Пару наблюдали в поселке 13 мая. Еще одну пару, сильно беспокоившуюся, — в мелколиственном приречном лесу 30 июня.

Рябинник *T. pilaris*. Обычный гнездящийся вид. Хорошо выражена его весенняя миграция: с НП отмечено 349 явно пролетных птиц, которые перемещались вдоль русла Васюгана крупными стаями с числом птиц от 37 до 150 (5 стай) и группами по 3–9 особей. В мелколиственном приречном лесу 5 июня осмотрено гнездо с кладкой из 6 яиц, оно располагалось на старой березе в 7 м от земли.

Белобровик *T. iliacus*. Обычный гнездящийся вид. В мелколиственном лесу 5 июня найдено гнездо с двумя яйцами, устроенное на поваленном дереве в 20 см от земли. При повторном осмотре гнезда

22 июня в нем находилось 4 маленьких незрячих птенца; самка слетала только при приближении руки.

Певчий дрозд *T. philomelos*. Обычный гнездящийся дрозд. Населяет заболоченные березово-сосновые леса и сосновые боры.

Деряба *T. viscivorus*. Обычный гнездящийся вид. Встречается в тех же типах леса, что и певчий дрозд.

Длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus*. Обычная, местами многочисленная, видимо, гнездящаяся птица. Весьма эвритопна: встречалась во всех типах леса, а также на облесенных болотах и лугах.

Пухляк *Parus montanus*. Обычная гнездящаяся птица. Гнездо найдено 14 мая на окраине березового болота; оно располагалось в дупле старой березы, на высоте около 1,5 м от земли. Глубокое дупло не удалось осмотреть, но оно было определено жилое, так как родители постоянно вылетали и залетали в него.

Московка *P. ater*. Обычная гнездящаяся птица. Предпочитает леса с участием темнохвойных пород.

Большая синица *P. major*. Обычная гнездящаяся птица. Многочисленна в поселке, реже встречалась в сосновых борах и приречных мелколиственных лесах.

Поползень *Sitta europaea*. Обычная гнездящаяся птица. Предпочитает леса с участием темнохвойных пород.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Многочисленная гнездящаяся птица поселков, в других биотопах не встречается. Кормление слетка родителями видели 2 июля.

Полевой воробей *P. montanus*. Обычная гнездящаяся птица. Нигде, кроме поселков, не наблюдался.

Зяблик *Fringilla coelebs*. Обычен, гнездится во всех типах леса. Миграция этой рано прилетающей птицы идет, по-видимому, еще и в мае: 8 мая отмечена стая из 25 особей, летящих на северо-восток.

Юрок *F. montifringilla*. Обычная гнездящаяся птица всех типов леса и облесенных болот.

Черноголовый щегол *Carduelis carduelis*. В районе исследований относительно редок, возможно, гнездится.

Коноплянка *Acanthis cannabina*. Единственная встреча: одиночный самец зарегистрирован в поселке 1 июля.

Чечетка *A. flammea*. Многочисленная весной и обычная в репродуктивный период птица; возможно, гнездится. В первой половине мая наблюдалась концентрация птиц в поселке, позднее они встречались только в лесах.

Чечевица *Carpodacus erythrinus*. Обычная гнездящаяся птица.

Населяет поселки, березово-сосновые и сосновые леса, облесенные болота и закустаренные луга.

Урагус *Uragus sibiricus*. Редок, возможно, гнездится. Отмечен только в приречных мелколиственных лесах во второй половине мая.

Клест-еловик *Loxia curvirostra*. Обычная гнездящаяся птица. Встречался и в сосновых, и в темнохвойных лесах.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. Обычная гнездящаяся птица. В первой половине мая часто встречался в поселках, позднее изредка регистрировался в светло- и темнохвойных лесах.

Дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. Весной многочисленная в поселках, в репродуктивный период редкая, возможно, гнездящаяся птица. В первой декаде мая в поселке встречали стайки до 30 особей и более мелкие группы.

Обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella*. Обычная гнездящаяся птица. Обитает на мезотрофных березовых болотах и закустаренных пойменных лугах.

Белошапочная овсянка *E. leucosephala*. Обычная гнездящаяся овсянка. Наблюдали концентрацию, возможно, пролетных птиц 15 мая на верховых сосново-сфагновых болотах. Слеток, около которого беспокоилась самка, найден 22 июня на опушке соснового леса.

Камышовая овсянка *E. schoeniclus*. Немногочисленная, видимо, гнездящаяся птица. Первый поющий самец отмечен 3 мая. Отмечалась на закустаренных пойменных лугах и мезотрофных березовых болотах.

Овсянка-ремез *E. rustica*. Обычная в период весенней миграции и позднее — редкая птица; возможно, гнездится.

Овсянка-крошка *E. pusilla*. Обычная, определенно гнездящаяся птица. Встречается на верховых сосново-сфагновых и переходных березовых болотах, а также на закустаренных пойменных лугах.

Дубровник *E. aureola*. Немногочисленная гнездящаяся птица заболоченных луговин среди поселков и пойменных лугов. Прилетает поздно, в последней пятидневке мая.

Пуночка *Plectrophenax nivalis*. Зимующая птица. В первой половине мая пуночек еще встречали в Привасюганье. С 5 по 7 мая отмечено с НП 3 стаи с числом птиц 18, 30 и 90, они перемещались на север-северо-восток.

ЛИТЕРАТУРА

Блинов В. Н. Врановые Западно-Сибирской равнины. М.: «КМК Scientific Press Ltd.», 1998. 284 с.